

Thông tin kê toa**Voltaren® 50 mg****THÀNH PHẦN:**

Mỗi viên nén tan trong ruột chứa 50 mg Diclofenac natri.

CHỈ ĐỊNH:

Viêm và các dạng thoái hóa của bệnh dạng thấp, Đợt cấp của bệnh gút, Đau sau chấn thương, đau sau mổ, viêm và sưng, Các tình trạng đau và/hoặc viêm trong phụ khoa, Điều trị phụ trợ trong các nhiễm khuẩn viêm đau nặng ở tai, mũi hoặc họng, như viêm họng amidan, viêm tai.

LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

Dùng liều thấp nhất có hiệu quả và thời gian ngắn nhất có thể. Người lớn 100-150 mg/ngày, chia 2-3 lần; Trẻ em trên 1 tuổi và thiếu niên 0,5-2 mg/kg/ngày, chia 2-3 lần. Nuốt nguyên viên thuốc với nước trong bữa ăn. Trong chứng đau kinh tiền phát, liều hàng ngày nên được điều chỉnh theo từng bệnh nhân và thường từ 50-150 mg. Nên dùng một liều 50-100 mg lúc khởi đầu và nếu cần, tăng lên trong liệu trình vài chu kỳ kinh nguyệt đến tối đa 200 mg/ngày.

PHẢN ỨNG PHỤ:

Rối loạn máu và hệ bạch huyết: Rất hiếm gặp - Rối loạn hệ miễn dịch: Hiếm gặp - Rối loạn tâm thần: Rất hiếm gặp - Rối loạn hệ thần kinh: thường gặp nhức đầu, chóng mặt - Rối loạn tiêu hóa: thường gặp buồn nôn, nôn, tiêu chảy, khó tiêu, đau bụng, đầy hơi, chán ăn, viêm dạ dày, xuất huyết dạ dày ruột - Rối loạn da và mô dưới da, thận, tiết niệu: hiếm gặp.

NGƯỜI CÓ THAI VÀ NGƯỜI NUÔI CON BÚ:

Chưa có nghiên cứu về việc sử dụng diclofenac ở phụ nữ có thai. Vì vậy, không nên dùng Voltaren trong 3 tháng đầu và 3 tháng giữa của thai kỳ trừ khi lợi ích dự tính đối với người mẹ cao hơn nguy cơ có thể có đối với thai nhi - Giống như các NSAID khác, diclofenac đi vào sữa mẹ với lượng nhỏ. Vì vậy, không nên dùng Voltaren trong khi cho con bú để tránh các tác dụng không mong muốn ở trẻ em. **Khả năng sinh sản:** Cũng như với các NSAID khác, việc sử dụng Voltaren có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ và không được khuyến cáo cho những người đang cố gắng thụ thai. Với những phụ nữ khó khăn trong việc thụ thai hoặc những người đang kiểm tra về vô sinh, việc ngừng sử dụng Voltaren nên được xem xét.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Loét dạ dày-tá tràng tiến triển. Người mẫn cảm với hoạt chất hoặc bất cứ tá dược nào. Suy gan, thận hoặc tim nặng, cũng giống các thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs) khác, Voltaren chống chỉ định cho bệnh nhân bị các cơn hen, mày đay hoặc viêm mũi cấp, xảy ra do acid acetylsalicylic hoặc các NSAIDs khác.

CẢNH BÁO:

Chảy máu, loét hoặc thủng dạ dày-ruột đã được báo cáo với tất cả các NSAIDs, kể cả diclofenac, và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào trong quá trình điều trị, có thể có hoặc không các triệu chứng báo trước hoặc ở người có tiền sử bị bệnh đường tiêu hóa nặng. Tai biến thường để lại những hậu quả nặng

hơn ở người cao tuổi. Nếu xảy ra chảy máu hoặc loét tiêu hóa cần ngừng thuốc ngay. Các phản ứng viêm da nghiêm trọng, hội chứng Stevens-Johnson được báo cáo rất hiếm khi sử dụng NSAID.

THẬN TRỌNG:

Bệnh nhân bị hen, viêm mũi dị ứng theo mùa, sưng tấy niêm mạc mũi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hoặc các nhiễm trùng mạn tính đường hô hấp, phù Quincke hoặc mày đay. Bệnh nhân có các triệu chứng rối loạn dạ dày ruột (GI) hoặc có tiền sử về loét, chảy máu hoặc thủng dạ dày hoặc ruột. Để làm giảm nguy cơ nhiễm độc dạ dày ruột ở những bệnh nhân có tiền sử loét, đặc biệt khi bị biến chứng chảy máu hoặc thủng và ở người già, việc điều trị nên được bắt đầu và duy trì ở liều thấp nhất có hiệu quả.

Bệnh nhân bị viêm đại tràng có loét hoặc bệnh Crohn. Bệnh nhân bị suy chức năng gan, bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa porphyrin gan: cần theo dõi chức năng gan. Bệnh nhân bị suy chức năng tim hoặc thận, có tiền sử bị tăng huyết áp, người già, bệnh nhân đang điều trị kết hợp với thuốc lợi tiểu hoặc các thuốc mà có thể ảnh hưởng đáng kể lên chức năng thận, và ở những bệnh nhân bị mất dịch ngoại bào nhiều do bất cứ nguyên nhân nào. Khi dùng Voltaren lâu dài, cũng như các NSAID khác, cần phải theo dõi công thức máu. Cũng như với các NSAID khác, Voltaren có thể nhất thời ức chế sự kết tập tiểu cầu. Cần theo dõi cẩn thận những bệnh nhân có rối loạn về cầm máu.

TÁC ĐỘNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ SỬ DỤNG MÁY MÓC:

Những bệnh nhân đang bị rối loạn thị giác, choáng váng, chóng mặt, buồn ngủ hoặc các rối loạn thần kinh trung ương khác trong khi đang dùng Voltaren nên ngừng lái xe và sử dụng máy móc

TƯƠNG TÁC THUỐC:

Nếu dùng đồng thời Voltaren với: - Lithi, digoxin sẽ làm tăng nồng độ trong huyết tương của các thuốc này. - Thuốc lợi tiểu hoặc chống tăng huyết áp: có thể làm giảm tác dụng chống tăng huyết áp. - NSAID khác và corticosteroid: tăng tần suất bị các tác dụng phụ trên dạ dày ruột. - Thuốc chống đông và kháng tiểu cầu: tăng nguy cơ chảy máu. - Thuốc ức chế tái hấp thu serotonin chọn lọc: tăng nguy cơ chảy máu dạ dày ruột. - Thuốc chống đái đường: kiểm soát nồng độ đường huyết được khuyến cáo như là một biện pháp phòng ngừa khi điều trị đồng thời. - Methotrexate: nồng độ trong máu và độc tính có thể tăng. - Ciclosporin: có thể làm tăng độc tính với thận của ciclosporin.

- Thuốc kháng khuẩn quinolon: có thể gặp co giật. - Thuốc ức chế CYP2C9 có hiệu lực: ức chế chuyển hóa diclofenac. - Phenytoin: kiểm soát nồng độ phenytoin do tăng phơi nhiễm với phenytoin.

QUÁ LIỀU:

Không có bệnh cảnh lâm sàng đặc hiệu do quá liều diclofenac

NHÀ SẢN XUẤT

Novartis Saglik Gida ve Tarim. Urunleri San. ve Tic.A.S. Yenisehir Mahallesi Dedepasa. Caddesi No. 17, 3491 Kurtkoy Istanbul-Turkey.

SDK: VN-13293-11

Voltaren® 50mg

Giảm đau hiệu quả...

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TP. HCM: Tòa nhà CENTEC, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Q. 3
Tel: (08) 3823 9090 - Fax: (08) 3823 9595

Nhà phân phối:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU TRUNG ƯƠNG 2
24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam