

# MIPIROM 1G

## Cefpirom 1g

**THÀNH PHẦN:** mỗi lọ chứa

Cefpirom .....1g

Dưới dạng Cefpirom sunfat ( hỗn hợp vô trùng của Cefpirom sunfat và Natri carbonat)

### CHỈ ĐỊNH:

Cefpirom không phải là kháng sinh ưu tiên dùng ban đầu, mà là kháng sinh dự trữ dùng trong các trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp và tiết niệu có biến chứng đe dọa tính mạng, nhiễm khuẩn huyết có nguồn gốc từ đường tiết niệu hoặc đường tiêu hóa và được phối hợp với kháng sinh chống các vi khuẩn kỵ khí.

### LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

#### Cách dùng:

+ Tiêm tĩnh mạch. Liều dùng và thời gian điều trị phụ thuộc vào mức độ nhiễm khuẩn, và chức năng thận của mỗi người.

+ Không khuyến cáo dùng cho trẻ em 12 tuổi

#### Liều Lượng:

+ Nhiễm khuẩn đường hô hấp có biến chứng: 2g mỗi 12 giờ 1 lần.

+ Nhiễm khuẩn đường tiết niệu có biến chứng: 1g mỗi 12 giờ 1 lần.

+ Nhiễm khuẩn huyết, hoặc nhiễm khuẩn đe dọa tính mạng: 2g mỗi 12 giờ 1 lần.

Liều dùng cho người suy thận:

Độ thanh thải creatinin (ml/phút)	Liều ban đầu 1g, Sau đó	Liều ban đầu 2g, Sau đó
50-20	0,5g x 2 lần /ngày	1g x 2lần /ngày
20-5	0,5g x 1 lần /ngày	1g x 1lần /ngày
<5 (Bệnh nhân thảm tách máu)	0,5 g/ngày + 0,25 g Ngay sau khi thẩm phân	1 g/ngày + 0,5 g Ngay sau khi thẩm phân

### CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Trường hợp dị ứng hay quá mẫn với cephalosporin hoặc penicillin.

### THẬN TRỌNG:

Trước khi bắt đầu điều trị bằng cefpirom, phải điều tra kỹ về tiền sử dị ứng của người bệnh với cephalosporin, penicillin hoặc thuốc khác.

Trong trường hợp dị ứng chéo có thể gây ra các phản ứng trầm trọng với cephalosporin

Đối với người bệnh suy thận cần giảm liều

Có nguy cơ tăng các phản ứng không mong muốn đối với thận, nếu dùng cefpirom phối hợp với các amonoglycosid (gentamicin, streptomycin...) và khi dùng cefpirom cùng các thuốc lợi tiểu quai.

Trong thời gian điều trị cũng như sau điều trị có thể tiêu chảy nặng và cấp, Khi dùng các kháng sinh phổ rộng. Đây có thể là triệu chứng của viêm đại tràng màng giả. Trong trường hợp này cần ngừng dùng thuốc và dùng kháng sinh thích hợp (metronidazol). Tránh dùng các thuốc gây táo bón.

### SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:

Thời kỳ mang thai: Kinh nghiệm lâm sàng trong điều trị

NHA  
18/7/14

cho người mang thai bằng cefpirom còn hạn chế. Nghiên cứu thực nghiệm trên súc vật không có nguy cơ gây quái thai. Nên chỉ dùng cho người mang thai khi thật sự cần thiết.

Thời kỳ cho con bú: chưa có đủ số liệu để đánh giá nguy cơ cho trẻ em. Vì vậy người ta khuyên nên ngừng cho con bú khi điều trị với cefpirom.

### TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ/VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Thuốc không gây buồn ngủ nên không có lời khuyên cho những người lái xe và vận hành máy móc

### TƯƠNG TÁC THUỐC:

Probenecid làm giảm sự bài tiết ở ống thận của các cephalosporin đào thải bằng cơ chế này, do đó làm tăng và kéo dài nồng độ cephalosporin trong huyết thanh, kéo dài chu kỳ bán thải và tăng nguy cơ độc của những thuốc này.

### TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:

Tiêu chảy là tác dụng không mong muốn thường gặp nhất.

Thường gặp: Viêm tĩnh mạch chỗ tiêm, tiêu chảy, buồn nôn, ngoại ban, tăng transaminase và phosphatase kiềm, tăng creatinin máu.

Ít gặp: đau đầu, kích ứng tại chỗ tiêm, sốt dị ứng, biếng ăn, nhiễm nấm *Candida*, tăng tiểu cầu, giảm bạch cầu ưa eosin, hạ huyết áp, chóng mặt, mất ngủ, co giật, đau bụng, táo bón, viêm miệng, ngứa, mày đay, khó thở, vị giác thay đổi, giảm chức năng thận.

Hiếm gặp: Phản ứng phản vệ, ngứa gà, giảm bạch cầu, thiếu máu tán huyết, dễ kích động, lú lẫn rối loạn tiêu hóa, chảy máu, viêm đại tràng màng giả, vàng da ứ mật, hen, giảm kali máu, viêm âm đạo/ cổ tử cung do nấm candida.

Thông báo ngay cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

### TƯƠNG KỶ

Cefpirom không được dùng chung với dung dịch bicarbonat.

### QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ LÝ:

Ngưng sử dụng thuốc.

Liều cao cefpirom trong huyết thanh sẽ giảm xuống bằng thẩm tách màng bụng, hoặc thẩm tách máu.

### BẢO QUẢN:

Nhiệt độ không quá 25°C, nơi khô, tránh ánh sáng.

### TIÊU CHUẨN: TCCS

**QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:** Hộp 1 lọ

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ

### SẢN XUẤT BỞI : CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM EUVI-PHARM

Bình Tiên 2, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An  
ĐT: +84(72)3779623- fax: +84(72)3779590