



PANADOL CÁM CÚM

- Giảm triệu chứng cảm cúm.
- Không gây buồn ngủ

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa Parace

CHỈ ĐỊNH: Panadol Cúm Cúm làm gi

LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG: Chỉ d
huyết, các thuốc chống cảm cúm kh
tối đa hàng ngày: 8 viên trong 24 gi
Không khuyến nghị dùng thuốc này.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng thuố
gần đây các thuốc ức chế monoamin

THẬN TRỌNG VÀ CÁC LƯU Ý ĐẶC B
hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEI
này cho bệnh nhân đang bị các bện
tuyến tiền liệt, bệnh mạch tắc nghẽn
những bệnh nhân đang bị các bện
cảm 3 vòng. Không nên dùng thuốc
này. Để xa tầm tay trẻ em. Thuốc có

THAI KỲ VÀ CHO CON BÚ: Khả năng
định nguy cơ nào đối với thai kỳ ho
Nếu không có chỉ định của bác sĩ thì
không xác định được bất cứ nguy cơ
mẹ nhưng vẫn chưa quan sát thấy đ

ẢNH HƯỞNG LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
hệ miễn dịch: Phản ứng quá mẫn. P
quản ở các bệnh nhân nhạy cảm với
không mong muốn này. Hệ thần ki
caffeine, có thể gặp các tác dụng ph
loạn tâm thần: Bồn chồn. Các rối lo
Buồn nôn, nôn. Rối loạn về mắt: Gi
trên tim: Nhịp tim nhanh, hồi hộp. C
tiểu. Thường hay xảy ra ở những bệ

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng kl

SẢN XUẤT TẠI: Công ty cổ phần d

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRI

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký qu
PANC&F- WEB- 101213