

ng cảm cúm

ol Cảm Cúm Extra chứa 500 mg Paracetamol, 10 mg Phenylephrine Hydrochloride, 15 mg Noscapine, 25 mg Caffeine, in hydrate.

giảm hiệu quả các triệu chứng phổ biến của cảm lạnh và cảm cúm bao gồm sốt, đau nhức cơ thể, khó chịu, nghẹt mũi, ho,

lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Uống 2 viên mỗi 6 giờ, không dùng quá 8 viên trong 24 giờ. Không nên sử dụng cùng các
dùng quá liều chỉ định.

ùng Panadol Cảm Cúm Extra cho bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với paracetamol hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc, trẻ
tong kinh hoặc co giật do sốt cao. Chống chỉ định dùng thuốc cho bệnh nhân bị suy gan hoặc suy thận nặng, tăng huyết áp,
n. Chống chỉ định dùng thuốc cho bệnh nhân đang dùng thuốc chống trầm cảm 3 vòng, thuốc chẹn beta và những bệnh nhân
monoamine oxidase trong vòng 2 tuần gần đây.

ÉT: Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven-Johnson (SJS),
(N) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Không dùng thuốc này nếu đang dùng một
hội chứng cảm khác. Nếu các triệu chứng không cải thiện sau khi dùng thuốc nhiều lần, nên dừng uống thuốc và xin tư vấn
ay của trẻ em. Nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú. Nếu bạn được chẩn đoán
iến bác sĩ trước khi dùng thuốc. Nếu bạn đang uống các thuốc chống đông máu (blood thinner như warfarin) và uống
an dài, điều này có thể gây tăng tác dụng chống đông máu và do vậy tăng nguy cơ chảy máu. Tuy nhiên, dùng Panadol Cảm
ác thuốc chống đông máu sẽ không gây tác dụng đáng kể nào cả.

ghiên cứu dịch tễ học trên phụ nữ có thai không cho thấy bất cứ tác dụng nào do paracetamol hoặc caffeine khi sử dụng
a phenylephrine hydrochloride trong thai kỳ vẫn chưa được biết đến một cách đầy đủ. Tuy nhiên, chỉ nên dùng thuốc trong
ic cần thiết bởi bác sĩ. Paracetamol và caffeine được bài tiết vào sữa mẹ, nhưng với lượng không đáng kể trên lâm sàng.
phenylephrine cho thấy không có chống chỉ định dùng chất này cho phụ nữ đang cho con bú. CSM của Anh khuyến nghị rằng
ống chỉ định cho phụ nữ trong giai đoạn có ý định mang thai (vì tác dụng tiềm tàng gây đột biến) nhưng quyết định này chỉ
tro.

hiếm có tác dụng không mong muốn do paracetamol nhưng phản ứng quá mẫn bao gồm phát ban có thể xảy ra. Rất hiếm có
ao gồm giảm tiểu cầu và chứng mất bạch cầu hạt, nhưng những tác dụng này không nhất thiết là do paracetamol. Các amine
làm tăng huyết áp cùng với đau đầu, chóng mặt, nôn, tiêu chảy, mất ngủ và hiếm khi bị hồi hộp, mặc dù có ít báo cáo về
ày khi dùng phenylephrine liều thông thường. Đã có báo cáo về phản ứng quá mẫn.

ông mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

SDN. BHD. Lot 89, Jalan Enggang, Ampang Ulu Kelang, Industrial Estate, 54200 Selangor, Malaysia.

ỐC KHI DÙNG.

g cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược: xxxx/xx/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm In tài liệu ngày ... tháng ... năm Code: