

Ung dụng: **Kamistad® - Gel N**

Kích thước (12 x 21 cm)

Hình thức: QUẢNG CÁO THUỐC TRÊN SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ, TỜ RƠI, ÁP PHÍCH, PANO, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG, TRÊN BÁO ĐIỆN TỬ, WEBSITE CỦA DOANH NGHIỆP, WEBSITE CỦA ĐƠN VỊ LÀM DỊCH VỤ QUẢNG CÁO.

Tài liệu dành cho công chúng

Kamistad® - Gel N

✓ Được chiết xuất từ dịch chiết HOA CÚC

✓ Giảm đau nhanh chóng



THÀNH PHẦN:

1 g gel chứa:

Lidocaine HCl 1 H₂O.....20.0 mg
Dịch chiết hoa cúc (1:4-5).....185.0 mg
Chất bảo quản: Benzalkonium chloride.....1.0 mg
Các thành phần khác: Tinh dầu quế, Saccharin natri 2H₂O, Carbomers, Trometamol, Acid formic khan 98%, Ethanol 96%, Nước tinh khiết.

CHỈ ĐỊNH

Các chứng viêm, đau ở niêm mạc miệng và môi, kể cả trong trường hợp có mụn nước, viêm lợi (nướu răng) và nứt nẻ môi do trời lạnh. Đối với người mang răng giả, thuốc dùng để bôi vào lợi, vòm miệng và niêm mạc bị kích ứng và mẫn cảm.

Ngăn ngừa các triệu chứng tại chỗ khi mọc răng sữa hoặc răng khôn và dùng trong phẫu thuật chỉnh răng.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Người lớn:

Trừ khi có các chỉ dẫn khác, đối với các chứng viêm lợi: mỗi lần bôi khoảng 1/2 cm chiều dài thuốc lấy ra từ ống thuốc, 3 lần mỗi ngày, vào các vùng sưng viêm và đau, lưu ý bôi nhẹ nhàng. Đối với các triệu chứng do răng giả gây ra, đặc biệt trong giai đoạn đầu chưa thích nghi, bôi gel với một lượng nhỏ bằng hạt đậu vào chỗ bị đau.

Trẻ em: Dùng 1/2 liều người lớn (1/4 cm chiều dài thuốc x 3 lần/ngày).

Trẻ nhỏ: Để giảm đau khi mọc răng sữa: bôi 1/4 cm chiều dài thuốc lấy ra từ ống thuốc. Không dùng quá 3 lần trong 24 giờ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Mẫn cảm với lidocaine hay các thuốc gây tê tại chỗ dạng amid khác, hoa cúc hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

LƯU Ý

Khi bôi thuốc vào niêm mạc: Kamistad® - Gel N nên được sử dụng đến khi không còn triệu chứng. Không nên dùng liều cao trong thời gian dài mà không có sự cho phép của bác sĩ.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Tính an toàn khi sử dụng Kamistad® - Gel N ở phụ nữ có thai và cho con bú chưa được đánh giá. Vì thế, không nên dùng thuốc trong thời kỳ này.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Thỉnh thoảng có cảm giác bỏng rát nhẹ khi bôi gel vào bề mặt da.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn dùng sau khi mở nắp là 12 tháng.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C.

ĐÓNG GÓI: Tuýp 10 g gel. Hộp 1 tuýp.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn nhà sản xuất.
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

Nhà phân phối: Công ty TNHH Dược Phẩm Khương Duy
NN1 - NN1A Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, VN
ĐT: 08. 3863 2083 (8 lines) Fax: 08. 3977 0850
Website: www.khuongduy.com.vn



Kích thước bản in = 85% kích thước thật

Mặt sau