


PIASCLEDINE® 300 Điều trị triệu chứng bệnh avocado and soybean unsaponifiables **thoái hóa khớp hông & khớp gối**



Cơ chế tác động tại Khớp



-  Sự gia tăng tổng hợp (PG) proteoglycans, đặc biệt nhóm có trọng lượng phân tử cao, với chất lượng tương tự như các PG tự nhiên.
-  Tác dụng bổ sung của hai thành phần của **PIASCLEDINE®**: ức chế cấp tính sự thoái biến PG và kích thích mãn tính sự tổng hợp PG.
-  Sự kích thích tổng hợp collagen bởi tế bào hoạt dịch và tế bào sụn khớp.

Tác dụng trên collagen là do làm giảm tác dụng ức chế của IL-1 và giảm tổng hợp PGE2 bởi các tế bào sụn.

PIASCLEDINE® cũng ức chế collagenase tuýp II ở khớp.

Cuối cùng, **PIASCLEDINE®** kích thích hoạt động của TGFβ1 và TGFβ2 và chất ức chế hoạt hóa plasminogen 1 (PAI-1). Các tác động này giải thích hiệu quả có lợi trên sự phục hồi và bảo vệ chất cơ bản ngoại bào.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Maheu E, et al. Arthritis Rheum 1998;41:81-91.
2. NSAIDs: non-steroidal anti-inflammatory drugs Blotman F, et al. Rev Rhum (Engl Ed) 1997;64:825-34.
3. Jordan KM. EULAR Recommendations 2003: an evidence based approach to the management of knee osteoarthritis: Report of a Task Force of the Standing Committee for International Clinical Studies Including Therapeutic Trials (ESCISIT). Ann Rheum Dis. 2003 Dec;62(12):1145-55.

Handwritten signature