

Cetirizin RVN®

Cetirizine dihydrochloride 10 mg

THÔNG TIN TÓM TẮT SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN

Cetirizin dihydroclorid.....10 mg

DẠNG TRÌNH BÀY

Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim.

DƯỢC LỰC HỌC

- Cetirizin dihydroclorid là một kháng histamin mạnh có tác dụng chống dị ứng, không gây buồn ngủ ở liều được lý, do không ảnh hưởng lên hệ thần kinh trung ương.
- Cetirizin ức chế giai đoạn sớm của phản ứng dị ứng qua trung gian histamin, làm giảm sự di dời của tế bào viêm và giảm giải phóng các chất trung gian ở giai đoạn muộn của phản ứng dị ứng.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

- Cetirizin có tác dụng đối kháng chọn lọc ở thụ thể H1, hầu như không có tác dụng đến các thụ thể khác.
- Cetirizin không gây tác động đối kháng acetylcholin và serotonin.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

- Cetirizin được hấp thu nhanh chóng sau khi uống. Nồng độ tối đa trong máu 0,3 microgam/ml sau 30 đến 60 phút.
- Cetirizin liên kết mạnh với huyết tương (khoảng 93%).
- 70% liều dùng được bài tiết qua nước tiểu dưới dạng không chuyển hóa trong vòng 72 giờ. Hệ số thanh thải ở thận là 30 ml/phút. Thời gian bán hủy trung bình là 11 giờ.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị triệu chứng của các phản ứng dị ứng

- Các thể viêm mũi dị ứng
- Mề đay vô căn mạn tính
- Phổi hợp điều trị hen suyễn do dị ứng
- Các biểu hiện dị ứng da, bệnh da vẩy nổi
- Viêm kết mạc do dị ứng
- Phù Quincke (sau khi điều trị sốc).

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

- **Liều dùng** thông thường như sau:
 - Người lớn và trẻ em 6 tuổi trở lên: 1 viên 10 mg duy nhất mỗi ngày.
 - Người bị suy thận (độ thanh thải creatinin là 11 – 31 ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7 ml/phút) và người bị suy gan: dùng liều 5 mg/lần/ngày.
- **Cách dùng:** uống nguyên viên thuốc, có thể uống trong hoặc ngoài bữa ăn.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với cetirizin, hydroxyzin.
- Trẻ em dưới 6 tuổi.

THẬN TRỌNG

- Cần phải chỉnh liều trong các trường hợp sau: suy thận, người đang thẩm phân thận, suy gan.
- Một số bệnh nhân hơi bị ngầy ngật do dùng quá liều hay do cơ địa. Trong trường hợp này, không dùng khi lái xe hoặc vận hành máy móc.
- Tránh dùng đồng thời Cetirizin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương do làm tăng tác dụng của các thuốc này.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

- Mặc dù nghiên cứu trên súc vật không thấy gây quái thai nhưng chưa có nghiên cứu đầy đủ trên phụ nữ mang thai, vì vậy không nên dùng khi có thai.
- Thuốc được bài tiết vào sữa mẹ, vì vậy không chỉ định cho phụ nữ đang cho con bú.

TƯƠNG TÁC THUỐC

Chưa thấy tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ thanh thải của cetirizin giảm nhẹ khi uống cùng 400 mg theophyllin.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN

Tác dụng phụ nhẹ và thoáng qua như: nhức đầu, hoa mắt, ngủ gật, khô miệng, buồn nôn.

SỬ DỤNG QUÁ LIỀU

- Triệu chứng quá liều: ngủ gà ở người lớn và kích động ở trẻ em.
- Quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ. Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu.

BẢO QUẢN

Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất theo TCCS.

SĐK:VD-9788-09

ĐỂ THUỐC XA TẦM TAY TRẺ EM

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại Công ty ROUSSEL VIỆT NAM
Số 1, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore,
Thuận An, Bình Dương - Việt Nam

Phân phối bởi Công ty CP XK PP & TT Dược Sài Gòn
(Sapharco MED)

