



Cetirizin RVN®

Cetirizine dihydrochloride 10 mg

Giảm nhanh triệu chứng
SỖ MŨI & NGỨA



Nguyen
7/7/14



THÔNG TIN TÓM TẮT SẢN PHẨM

THÀNH PHẦN: Cetirizin dihydroclorid 10 mg. **DẠNG TRÌNH BÀY:** Hộp 3 vỉ x 10 viên bao phim. **CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng của các phản ứng dị ứng: Các thể viêm mũi dị ứng, mề dáy vô căn mạn tính, phối hợp điều trị hen suyễn do dị ứng, các biểu hiện dị ứng da, bệnh da vẩy nổi, viêm kết mạc do dị ứng, phù Quincke (sau khi điều trị sốc). **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Liều dùng thông thường như sau: Người lớn và trẻ em 6 tuổi trở lên: 1 viên 10 mg duy nhất mỗi ngày. Người bị suy thận (độ thanh thải creatinin là 11 – 31 ml/phút), người bệnh đang thẩm tích máu (độ thanh thải creatinin < 7 ml/phút) và người bị suy gan: dùng liều 5 mg/lần/ngày. Cách dùng: uống nguyên viên thuốc, có thể uống trong hoặc ngoài bữa ăn. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với cetirizin, hydroxyzin. Trẻ em dưới 6 tuổi. **THẬN TRỌNG:** Cần phải chỉnh liều trong các trường hợp sau: suy thận, người đang thẩm phân thận, suy gan. Một số bệnh nhân hơi bị ngáy ngạt do dùng quá liều hay do cơ địa. Trong trường hợp này, không dùng khi lái xe hoặc vận hành máy móc. Tránh dùng đồng thời Cetirizin với rượu và các thuốc ức chế thần kinh trung ương do làm tăng tác dụng của các thuốc này. **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** không nên dùng khi có thai. Không chỉ định cho phụ nữ đang cho con bú. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Chưa thấy tương tác đáng kể với các thuốc khác. Độ thanh thải của cetirizin giảm nhẹ khi uống cùng 400 mg theophyllin. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Tác dụng phụ nhẹ và thoáng qua như: nhức đầu, hoa mắt, ngủ gật, khô miệng, buồn nôn. **SỬ DỤNG QUÁ LIỀU:** Triệu chứng quá liều: ngủ gà ở người lớn và kích động ở trẻ em. Quá liều nghiêm trọng cần gây nôn và rửa dạ dày cùng với các phương pháp hỗ trợ. Chưa có thuốc giải độc đặc hiệu. **BẢO QUẢN:** Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng. **HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Sản xuất theo TCCS. SĐK:VD-9788-09 ĐỂ THUỐC XA TẮM TAY TRẺ EM. ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất tại Công ty ROUSSEL VIỆT NAM - Số 1, đường số 3, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương - Việt Nam

Phân phối bởi Công ty CP XK PP & TT Dược Sài Gòn (Sapharco MED)



Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của CQLD-BYT:

Ngày in tài liệu: