

Bivazit 250

Azithromycin 250 mg

Điều trị:

- Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên, dưới, viêm tai giữa.
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm.
- Nhiễm khuẩn đường sinh dục chưa biến chứng.



Bivazit 250

Azithromycin 250 mg

CHỈ ĐỊNH:
- Nhiễm khuẩn đường hô hấp dưới: viêm phế quản, viêm phổi.
- Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên: Viêm xoang, viêm họng và viêm amidan.
- Viêm tai giữa.
- Các nhiễm khuẩn da và mô mềm.
- Nhiễm khuẩn đường sinh dục chưa biến chứng do Chlamydia trachomatis hoặc do Neisseria gonorrhoeae không đa kháng ở cả nam và nữ.
LIỀU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:
Liều dùng: Thuốc thích hợp dùng cho người lớn và trẻ em trên 45kg: 1 lần mỗi ngày, 1 giờ trước bữa ăn hoặc 2 giờ sau bữa ăn.
- Điều trị bệnh lây qua đường sinh dục dùng liều duy nhất 1g (4 viên).
- Các cấp độ khác dùng liều 500mg (2 viên) cho ngày đầu và dùng liều 250mg (1 viên) cho 4 ngày kế tiếp.
Cách dùng: Uống thuốc 1 lần mỗi ngày, 1 giờ trước bữa ăn hoặc 2 giờ sau bữa ăn.
- Đối với bệnh nhân lớn tuổi: không cần giảm liều
- Đối với bệnh nhân suy gan và suy thận nhẹ (độ thanh thải Creatinin >40 ml/phút): không cần giảm liều.
- Không có tài liệu về sử dụng cho người suy thận nặng.
- Trẻ em dưới 45kg cân nặng nên dùng dạng thuốc cốm pha hỗn dịch uống.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
Quá mẫn cảm với Azithromycin hoặc với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
- Có tiền sử quá mẫn cảm với kháng sinh thuộc nhóm Macrolid.
- Suy thận nặng, suy gan nặng.
NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO KHI SỬ DỤNG THUỐC
- Để tránh nguy cơ kháng thuốc, chỉ nên dùng Azithromycin cho người bệnh bị dị ứng và không dùng được Penicillin.
- Cần thận trọng khi sử dụng Azithromycin và các Macrolid khác vì khả năng gây dị ứng như phù thận kinh mạch và phản ứng phản vệ rất nguy hiểm (tuy ít xảy ra).
- Cũng như với các kháng sinh khác, trong quá trình sử dụng thuốc, phải quan sát các dấu hiệu bội nhiễm bởi các vi khuẩn không nhạy cảm với thuốc, kể cả nấm.
- Không cần chỉnh liều cho người bệnh suy thận vừa có hệ số thanh thải Creatinin trên 40ml/phút.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC, CÁC DẠNG THUỐC TÁC KHÁC

- Các thuốc kháng acid làm giảm sự hấp thu Azithromycin, do đó khi cần sử dụng đồng thời nên dùng vào 1 giờ trước hay 2 giờ sau khi dùng thuốc kháng acid.
- Do có thể xảy ra tương tác giữa Azithromycin và Cyclosporin, nên khi cần thiết phải dùng chung thì phải kiểm tra nồng độ Cyclosporin và điều chỉnh liều dùng cho thích hợp.
- Azithromycin có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa Digoxin trong ruột, vì vậy khi sử dụng đồng thời hai thuốc này cần phải theo dõi nồng độ Digoxin.
- Cũng như các kháng sinh Macrolid khác, không nên sử dụng đồng thời Azithromycin với các dẫn chất nằm cạnh gá vì có khả năng gây ngộ độc ergotin.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Chưa có nghiên cứu đầy đủ trên người mang thai và khả năng bài tiết của thuốc qua sữa mẹ. Do đó chỉ nên sử dụng Azithromycin cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú khi không có các thuốc thích hợp khác.

Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc

Dùng thuốc thận trọng cho người lái xe hoặc vận hành máy móc.

Sử dụng quá liều

Chưa có tài liệu về quá liều Azithromycin; triệu chứng điển hình qua liều của kháng sinh Macrolid thường là giảm sức nghe, buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Nếu cần thiết nên chỉ định rửa dạ dày và điều trị hỗ trợ.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC

Azithromycin được dung nạp tốt, tỷ lệ tác dụng không mong muốn thấp (khoảng 13%).
- Rối loạn tiêu hóa (khoảng 10%): buồn nôn, đau bụng, co cứng cơ bụng, nôn, đầy hơi, tiêu chảy, nhưng thường nhẹ và ít xảy ra hơn so với dùng erythromycin.
- Thay đổi tạm thời số lượng bạch cầu trung tính, tăng tạm thời enzym gan.
- Đôi khi gặp phát ban, đau đầu và chóng mặt.
- Sử dụng lâu dài ở liều cao Azithromycin có thể làm giảm sức nghe có hồi phục ở một số người bệnh. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nhiệt độ không quá 25°C, tránh ánh sáng và ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA THẦY THUỐC ĐƯỢC KÝ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC KHI DÙNG. NẾU CẦN TIÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ ĐỂ XÁC ĐỊNH TAY CỤAT RE EM.

