Calcium Sandoz dạng sủi cung cấp
ên tố với sự kết hợp từ **2 thành phần Canxi:**

uconat

Calcium carbonat

i bọt: Calcium lactat gluconat 2940mg, Calcium carbonat 300mg, tương
/iên nén sủi bọt. **Chỉ định:** Thuốc này chứa canxi. Được dùng trong trường
). • Để điều trị hỗ trợ tình trạng mất canxi ở xương của người lớn tuổi, hoặc
g giai đoạn phục hồi vận động sau một thời gian bị bất động kéo dài. **Liều**
n trên 10 tuổi: 2 viên/ngày. Trẻ em từ 6-10 tuổi: 1 viên/ngày. **Cách dùng:**
hoặc nhai viên thuốc. **Tác dụng không mong muốn:** Rất hiếm gặp (xảy
ảy mặt, môi, lưỡi, và/hoặc họng, có thể gây khó nuốt. Hiếm gặp (xảy ra <
nôn mửa, ngứa, ban đỏ và/hoặc nóng bỏng ở da. Không phổ biến (xảy ra
) hoặc thải trừ canxi qua đường tiểu nhiều (tăng canxi niệu). **Chống chỉ**
g canxi huyết. • Tăng canxi niệu. • Sỏi canxi (sỏi thận), vôi hóa mô. • Bất
trọng: • Bệnh nhân suy thận: cần kiểm tra hàm lượng canxi trong nước
ng mỗi viên nén sủi bọt) khi sử dụng cho bệnh nhân theo chế độ dinh
t 2 giờ giữa thời điểm uống các chế phẩm thuốc chứa biphosphonat,
Calcium Sandoz. **Lưu ý đặc biệt:** Uống quá nhiều canxi có thể gây
g được dùng cho bệnh nhân không dung nạp với fructose, hoặc
ut enzyme sucrase-isomaltase (các bệnh về chuyển hóa hiếm
ặc dược sĩ của bạn trước khi dùng bất kỳ thuốc nào. Trường
huốc này trong thời gian bạn mang thai hoặc cho con bú.
hà sản xuất: Novartis Pharma (Pakistan) Ltd., Petaro
xin liên hệ: VPĐD Zuellig Pharma Pte Ltd. Tầng 5,
Thái Bình, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 08 3910 2650.

VARTIS

3

CÔNG TY ZUELLIG PHARMA PTE LTD
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH