


JAPROLOX[®]




Daiichi-Sankyo




THUỐC KHÁNG VIÊM - GIẢM ĐAU - HẠ SỐT LOXOPROFEN

Nồng độ trong huyết tương sau khi dùng viên nén JAPROLOX liều đơn 60mg¹



	C _{max} (µg/mL)	T _{max} (hr)	T _{1/2} (hr)
Loxoprofen	5.04	0.45	1.22
Trans-OH form	0.85	0.79	1.31

91,6% bệnh nhân hài lòng về hiệu quả kháng viêm và giảm đau của loxoprofen²



■ Hài lòng ■ Không hài lòng ■ Thuốc không hiệu quả

Nghiên cứu tiến cứu khảo sát hiệu quả và tác dụng phụ của loxoprofen trên 1206 bệnh nhân (569 nam và 637 nữ) tại các phòng khám chấn thương chỉnh hình tại Thái Lan. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 56.4 ± 14.9. Ban đầu, tất cả bệnh nhân sử dụng loxoprofen 60 mg 3 lần/ngày sau khi ăn. Sau đó liều được điều chỉnh tùy từng bệnh nhân dao động từ 120mg/ngày tới hơn 180mg/ngày để tối ưu hóa hiệu quả điều trị với liều dùng thấp nhất. Có 91,6% bệnh nhân hài lòng về hiệu quả kháng viêm và giảm đau của loxoprofen.

Thông tin chi tiết về sản phẩm xem ở trang 2

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý Dược-Bộ Y Tế: XXXX/XX/QLD-TT, Ngày ... tháng ... năm ...

Ngày in tài liệu: ngày ... tháng ... năm ...



2715/14
ABZ