



BACIVIT

PHÒNG NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ TIÊU CHẢY, RỐI LOẠN TIÊU HÓA.

Thành phần:

Lactobacillus acidophilus10⁸ CFU.

Dạng bào chế: Thuốc bột uống.

Chỉ định:

Phòng ngừa và điều trị các rối loạn tiêu hóa: tiêu chảy, táo bón, kém hấp thu, khó tiêu do cân bằng vi sinh vật đường ruột bị phá vỡ sau khi uống kháng sinh, rượu....

Liều dùng và cách dùng:

Liều thông thường:

Người lớn: Uống 1 gói/lần, 3 lần/ngày.

Trẻ em: 1-2 gói/ngày.

Tiêu chảy: uống 4-8 gói/ngày.

Táo bón: 6 gói/ngày.

Rối loạn tiêu hóa do dùng kháng sinh:

Liều dự phòng: Uống 2 gói/ngày.

Liều điều trị: Uống 4-8 gói/ngày cho đến khi hết triệu chứng bệnh.

Chống chỉ định: Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Những lưu ý đặc biệt và cảnh báo khi dùng thuốc: Trong trường hợp tiêu chảy, ngoài việc dùng thuốc cần có chế độ bù nước và trị liệu thích hợp.

Tương tác thuốc: Bacivit ngăn cản sự hấp thu Tetracyclin.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Thận trọng khi dùng thuốc trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú.

Tác dụng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa có báo cáo về các dụng không mong muốn xảy ra khi dùng thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.

Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

NSX: Công Ty Liên Doanh Dược Phẩm MEBIPHAR-AUSTRAPHARM

Địa chỉ: Lô III-18, đường số 13, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, TP. HCM.

Số Giấy tiếp nhận HSDKQC thuốc của Cục QLD-BYT:/...../QLD-TT, ngày/..

Ngày...tháng...năm...in tài liệu.



8/7/19

AB