

Tài liệu dành cho công chúng

Stacytine 200

Acetylcystein 200 mg

Nguyen 25/6/14

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén sủi bọt chứa:

Acetylcystein.....200,0 mg

Tá dược vừa đủ1 viên

MÔ TẢ

Viên nén tròn, màu trắng ngà đến vàng nhạt, hai mặt bằng.

CHỈ ĐỊNH

- Acetylcystein được dùng làm thuốc tiêu chất nhầy trong điều trị hỗ trợ cho những bệnh nhân bị tiết chất nhầy bất thường, bệnh hen suyễn hay trong những bệnh lý có đờm nhầy đặc quánh như viêm phế quản cấp và mạn tính.
- Acetylcystein được dùng như một chất giải độc trong điều trị quá liều paracetamol.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG

Stacytine 200 được dùng bằng đường uống bằng cách hòa tan viên nén sủi bọt trong nước.

Tiêu chất nhầy:

- Trẻ em từ 2 đến 6 tuổi: 200 mg x 2 lần/ngày.
- Người lớn: 200 mg x 3 lần/ngày hoặc 600 mg x 1 lần/ngày.

Giải độc quá liều paracetamol:

- Liều khởi đầu 140 mg/kg, tiếp theo cách 4 giờ uống một lần với liều 70 mg/kg và uống tổng cộng thêm 17 lần. Acetylcystein được báo cáo có hiệu quả tốt nhất khi dùng trong vòng 8 giờ sau khi bị quá liều paracetamol, hiệu quả bảo vệ giảm đi sau thời gian này. Tuy nhiên, bắt đầu điều trị chậm hơn 24 giờ sau đó có thể vẫn còn có ích.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

- Quá mẫn với acetylcystein hay bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Bệnh nhân hen hoặc có tiền sử co thắt phế quản.
- Trẻ em dưới 2 tuổi.

THẬN TRỌNG

- Khi uống acetylcystein điều trị quá liều paracetamol có

thể gây nôn hoặc làm trầm trọng thêm tình trạng nôn, bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết dạ dày nên được cân nhắc giữa nguy cơ xuất huyết dạ dày và hậu quả gây độc gan của paracetamol để có hướng sử dụng acetylcystein hợp lý.

- Bệnh nhân hen khi dùng acetylcystein phải được giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình điều trị; nếu có thắt phế quản xảy ra, phải dùng thuốc phun mù giãn phế quản. Nếu có thắt phế quản vẫn tiến triển, phải ngừng acetylcystein ngay lập tức.
- Khi điều trị với acetylcystein có thể xuất hiện nhiều đờm loãng ở phế quản. Nếu người bệnh giảm khả năng ho, phải hút cơ học hoặc đặt ống hút trong khí quản để thông đường thở cho bệnh nhân.
- Bệnh nhân suy gan: Độ thanh thải toàn phần của acetylcystein giảm đáng kể ở những bệnh nhân xơ gan và thời gian bán thải gần như gấp hai lần so với những người khỏe mạnh.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Phụ nữ có thai

Liều trị quá liều paracetamol bằng acetylcystein ở người mang thai có hiệu quả, an toàn và có khả năng ngăn chặn được độc tính cho gan ở thai nhi cũng như ở người mẹ.

Phụ nữ cho con bú

Thuốc dùng an toàn cho người cho con bú.

BẢO QUẢN

Trong bao bì kín, nơi khô, tránh ánh sáng và tránh ẩm. Nhiệt độ không quá 30°C.

HẠN DÙNG

24 tháng kể từ ngày sản xuất.

ĐÓNG GÓI

Ví xé 4 viên. Hộp 4 ví.

Tuýp 10 viên. Hộp 1 tuýp.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

Tiêu chuẩn nhà sản xuất.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG