



Nguyen
26/3/14

Pharmaton®

Matruelle

HỖN HỢP
Omega 3^{DHA}
SẮT và AXIT FOLIC



Khỏe cho mẹ. Tốt cho bé

Thành phần: Beta-carotene: 2mg; Vitamin B1: 1,4mg; Vitamin B2: 1,4mg; Vitamin B6: 1,5mg; Vitamin B12: 2,6mg; Vitamin C: 85mg; Vitamin D3: 200IU; Vitamin E: 15mg; Acid folic: 600mcg; Biotin: 30mcg; Nicotinamide: 18mg; Crom: 30mcg; Đồng: 1mg; Sắt: 14mg; Iốt: 150mcg; Molybden: 50mcg; Selen: 50mcg; Kẽm: 11mg; Magie: 10mg; Omega-3-axit triglyceride: 300mg-chứa 50% DHA: 150mg. **Liều lượng và cách dùng:** Phụ nữ có thai và cho con bú, phụ nữ dự định có thai – 1 viên nang mềm mỗi ngày vào buổi sáng cùng với thức ăn hoặc nước uống. Nên uống thuốc vào bữa ăn. Thành phần sắt trong thuốc có thể gây buồn nôn hoặc nôn nếu uống thuốc lúc đói. Điều này có thể gây buồn nôn và nôn nặng thêm do thai nghén. Trong trường hợp ốm nghén, có thể uống thuốc vào buổi trưa hoặc buổi tối. **Chống chỉ định:** Không dùng đồng thời với các chế phẩm chứa vitamin D, quá liều vitamin D, suy thận, quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc; Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với đậu tương hoặc lạc; tăng canxi máu, tăng canxi niệu, sỏi canxi thận, thiếu máu hồng cầu to; Rối loạn chuyển hóa sắt; cường giáp; Bệnh di truyền hiếm gặp không dung nạp với tá dược của thuốc. **Cảnh báo và thận trọng:** Không dùng quá liều hàng ngày do liều cao một số vitamin, khoáng chất, yếu tố vi lượng có thể gây tác dụng phụ nhất là khi dùng trong thời gian dài. Phòng quá liều vitamin D3 (xem "Thai kỳ và cho con bú"). Lượng lớn (>4g/ngày) acid béo omega-3 làm tăng thời gian máu chảy, giảm kết tập tiểu cầu, giảm độ nhớt máu và fibrinogen. Không thấy thay đổi yếu tố đông máu trong một thử nghiệm về dung nạp thuốc. Thuốc chứa 5 mg lactose/1 viên. Bệnh nhân với bệnh di truyền hiếm gặp không dung nạp galactose không nên dùng thuốc này. Bổ sung 20 mg beta-carotene/ngày (10 viên/ngày) trong thời gian dài (24 tháng) gây tăng nguy cơ ung thư phổi ở người nghiện thuốc lá nặng (≥20 điếu/ngày). **Thai kỳ và cho con bú:** Việc sử dụng Pharmaton Matruelle cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú nên được quyết định bởi bác sĩ. Cần phòng ngừa quá liều Vitamin D, do tăng canxi máu kéo dài có thể gây chậm phát triển trí tuệ hoặc thể chất, hẹp eo động mạch chủ, hoặc bệnh vông mạc ở trẻ em. **Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy:** Chưa nghiên cứu về ảnh hưởng của Pharmaton Matruelle lên khả năng lái xe và vận hành máy móc. **Tác dụng phụ:** Rối loạn hệ miễn dịch: Quá mẫn. Rối loạn đường tiêu hóa: Không dung nạp đường tiêu hóa (như khó chịu ở dạ dày, táo bón, tiêu chảy, buồn nôn và nôn). **Quá liều:** Quá liều iốt có thể gây cường giáp. **Sản xuất:** Swiss Caps AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg, THỤY SỸ. Đóng gói và xuất xưởng bởi: Ginsana S.A Via Mulini, CH-6934 Bioggio, THỤY SỸ. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế:
xxxx/xx/ QLD-TT ngày xx tháng xx năm xxxx; Ngày xx tháng xx năm xxxx in tài liệu.

 **Boehringer
Ingelheim**

Tỉ lệ: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10