

Panadol®

Thành phần: Paracetamol 500 mg. **Chỉ định:** Panadol Viên sủi chứa paracetamol là một chất hạ sốt, giảm đau, giảm viêm, giảm đau họng, đau cơ xương, sốt và đau sau khi tiêm vaccin, đau sau khi nhổ răng hoặc sau các thủ thuật nha khoa.
Người lớn (kể cả người cao tuổi), trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Hòa tan 1 - 2 viên trong ít nhất nửa cốc nước. Không dùng quá liều chỉ định. Không nên sử dụng với các thuốc khác có chứa paracetamol. Khoảng cách giữa các lần uống: 4-6 giờ nếu cần. Liều tối đa hàng ngày: 60 mg/kg cân nặng chia thành nhiều lần, mỗi lần 10-15 ml nước. Không dùng quá 4 liều trong 24 giờ. Khoảng cách liều tối thiểu: 4 giờ. Thời gian trị liệu không vượt quá 7 ngày. Không cho trẻ em dưới 6 tuổi.
Chống chỉ định: Chống chỉ định dùng Panadol Viên sủi cho những bệnh nhân bị suy gan nặng, dị ứng với bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Đặc biệt: Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson hoặc ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Có sự gia tăng nguy cơ gây hại của paracetamol đối với gan trên nền tảng của việc lạm dụng rượu. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này. Nếu các triệu chứng còn dai dẳng, tham khảo ý kiến bác sĩ. Do vậy không nên sử dụng Panadol Viên sủi trên những bệnh nhân kiêng muối. Mỗi viên Panadol Viên sủi chứa 1 mg natri. Panadol Viên sủi chứa aspartame, một nguồn phenylalanine. Bệnh nhân bị phenylketonuria (PKU) nên tránh dùng Panadol Viên sủi.
Sản phẩm: Chưa có dữ liệu. **Phụ nữ mang thai:** Các nghiên cứu trên người và động vật vẫn chưa xác định được mức độ an toàn của paracetamol trong thai kỳ. Các nghiên cứu trên người với paracetamol không xác định được bất cứ nguy cơ nào đối với phụ nữ mang thai.
Tác dụng phụ: Rất hiếm gặp: giảm tiểu cầu, phản ứng quá mẫn, phản ứng mẫn cảm trên da như: ban đỏ, ngứa, phát ban, sưng mắt, sưng miệng, sưng cổ họng, khó thở, phù nề, sốc phản vệ. Cũng có thể xảy ra các tác dụng phụ của các NSAID khác, bất thường gan.
Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải.

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược: xxx/xx/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm ...

U - HẠ SỐT NHANH



Thị Huyền
15/18/144



để giảm đau, a/ Điều trị cơn đau từ nhẹ đến vừa bao gồm: đau đầu, đau nửa đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau khớp, đau răng, đau do viêm xương khớp. b/ Hạ sốt. **Liều lượng và cách dùng:** Chỉ dùng đường uống. Uống cho mỗi 4 - 6 giờ, nếu cần. Liều dùng hàng ngày tối đa cho người lớn: 4000 mg/ngày (8 viên/ngày). Tối thiểu dùng liều lặp lại: 4 giờ. **Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi:** Hòa tan 250 - 500 mg trong ít nhất nửa cốc nước. 15 mg/kg cân nặng dùng trong 24 giờ. Không dùng quá liều chỉ định. Không dùng với các thuốc khác có tiền sử quá mẫn với paracetamol hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. **Thận trọng và cảnh báo:** Hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban, những bệnh nhân đang bị các bệnh về gan. Những bệnh nhân được chẩn đoán là suy gan hoặc suy thận nên tránh dùng thuốc. Để xa tầm tay trẻ em. Mỗi viên Panadol Viên sủi chứa 427 mg natri (2 viên chứa 854 mg natri), mỗi viên chứa 50 mg sorbitol. Không dùng thuốc cho những bệnh nhân có bệnh di truyền hiếm gặp về không dung nạp - niệu không nên dùng thuốc này. **Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Khả năng sinh con bất kỳ nguy cơ nào của paracetamol đối với thai kỳ hoặc sự phát triển phôi thai. **Phụ nữ cho con bú:** Sử dụng thuốc cho con bú hoặc trẻ bú mẹ. Paracetamol qua được hàng rào nhau thai và được bài tiết vào sữa mẹ. **Chống chỉ định:** Không dùng thuốc cho bệnh nhân có tiền sử dị ứng với aspirin và các dẫn xuất của aspirin, hội chứng Stevens-Johnson, có thất phế quản ở các bệnh nhân mẫn cảm với aspirin và các dẫn xuất của aspirin. **Hỏi khi dùng thuốc.** Sản xuất bởi: GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd (Consumer Healthcare Division),