



GIẢM ĐAU HẠ SỐT NHANH

Nguyễn Thị Ngọc Anh
13/8/14

Panadol



Panadol

Viên sủi

Giảm đau - hạ sốt
Không hại dạ dày
Vị Chanh





www.panadol.com/vn

Thành phần: Paracetamol 500 mg. **Chỉ định:** Panadol Viên sủi chứa paracetamol là một chất hạ sốt và giảm đau. a/ Điều trị cơn đau từ nhẹ đến vừa bao gồm: đau đầu, đau nửa đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau họng, đau cơ xương, sốt và đau sau khi tiêm vaccin, đau sau khi nhổ răng hoặc sau các thủ thuật nha khoa, đau răng, đau do viêm xương khớp. b/ Hạ sốt. **Liều lượng và cách dùng:** Chỉ dùng đường uống. **Người lớn (kể cả người cao tuổi), trẻ em từ 12 tuổi trở lên:** Hòa tan 1 - 2 viên trong ít nhất nửa cốc nước cho mỗi 4 - 6 giờ, nếu cần. Liều dùng hàng ngày tối đa cho người lớn: 4000 mg/ngày (8 viên/ngày). Không dùng quá liều chỉ định. Không nên sử dụng với các thuốc khác có chứa paracetamol. Khoảng cách tối thiểu dùng liều lặp lại: 4 giờ. **Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi:** Hòa tan 250 - 500 mg trong ít nhất nửa cốc nước cho mỗi 4 - 6 giờ nếu cần. Liều tối đa hàng ngày: 60 mg/kg cân nặng chia thành nhiều lần, mỗi lần 10 - 15 mg/kg cân nặng dùng trong 24 giờ. Không dùng quá liều chỉ định. Không dùng với các thuốc khác có chứa paracetamol. Không dùng quá 4 liều trong 24 giờ. Khoảng cách liều tối thiểu: 4 giờ. Thời gian tối đa dùng thuốc không có tư vấn của bác sĩ: 3 ngày. **Trẻ em dưới 6 tuổi:** Không khuyến cáo dùng thuốc cho trẻ em dưới 6 tuổi. **Chống chỉ định:** Chống chỉ định dùng Panadol Viên sủi cho những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với paracetamol hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc. **Thận trọng và cảnh báo đặc biệt:** Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mủn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Có sự gia tăng nguy cơ gây hại của paracetamol đối với gan trên những bệnh nhân đang bị các bệnh về gan. Những bệnh nhân được chẩn đoán là suy gan hoặc suy thận nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này. Nếu các triệu chứng còn dai dẳng, tham khảo ý kiến bác sĩ. Để xa tầm tay trẻ em. Mỗi viên Panadol Viên sủi chứa 427 mg natri (2 viên chứa 854 mg natri), do vậy không nên sử dụng Panadol Viên sủi trên những bệnh nhân kiêng muối. Mỗi viên Panadol Viên sủi chứa 50 mg sorbitol. Không dùng thuốc cho những bệnh nhân có bệnh di truyền hiếm gặp về không dung nạp fructose. Panadol Viên sủi chứa aspartame, một nguồn phenylalanine. Bệnh nhân bị phenylketon-niêu không nên dùng thuốc này. **Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: Khả năng sinh sản:** Chưa có dữ liệu. **Phụ nữ mang thai:** Các nghiên cứu trên người và động vật vẫn chưa xác định được bất kỳ nguy cơ nào của paracetamol đối với thai kỳ hoặc sự phát triển phôi thai. **Phụ nữ cho con bú:** Các nghiên cứu trên người với paracetamol không xác định được bất cứ nguy cơ nào đối với phụ nữ cho con bú hoặc trẻ bú mẹ. Paracetamol qua được hàng rào nhau thai và được bài tiết vào sữa mẹ. **Tác dụng phụ:** Rất hiếm gặp: giảm tiểu cầu, phản ứng quá mẫn, phản ứng mẫn cảm trên da như: ban đỏ, phù mạch, hội chứng Stevens-Johnson, có thể phết quần ở các bệnh nhân mẫn cảm với aspirin và các NSAID khác, bất thường gan. **Thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc. Sản xuất bởi:** GlaxoSmithKline Australia Pty Ltd (Consumer Healthcare Division), 82 Hughes Ave ERMINGTON NSW 2115 AUSTRALIA.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược: xxx/xx/QLD-TT, ngày ... tháng ... năm ...
In tài liệu ngày ... tháng ... năm Code: PANEFF - V - 190314

Panadol là nhãn hiệu đã được đăng ký của tập đoàn GlaxoSmithKline.