



CANXI NGUYÊN TỐ - CHO XƯƠNG CHẮC KHOẺ MỖI NGÀY

Viên nén sủi bọt cấp 500mg Canxi nguyên tố
Thành phần Canxi:

Calcium lactat gluconat



Calcium carbonat

Calcium Sandoz 500mg. Thành phần: Cho 1 viên nén sủi bọt: Calcium lactat gluconat 2940mg, Calcium carbonat 300mg, tương đương 500 mg nguyên tố canxi.
Viên nén sủi bọt. **Chỉ định:** Thuốc này chứa canxi. Được dùng trong trường hợp: • Thiếu canxi do nhu cầu tăng cao (sinh trưởng, thai kỳ, cho con bú). • Để điều trị loãng xương ở người lớn tuổi, hoặc sau thời kỳ mãn kinh, hoặc sau khi dùng liệu pháp corticoid, hoặc trong giai đoạn phục hồi vận động sau một thời gian bị bất động kéo dài.
và trẻ em trên 6 tuổi. Người lớn và trẻ em trên 10 tuổi: 2 viên/ngày. Trẻ em từ 6-10 tuổi: 1 viên/ngày. **Cách dùng:** Đường uống. Hòa tan viên sủi bọt trong một ly nước. **Tác dụng không mong muốn:** Rất hiếm gặp (xảy ra < 1/10.000 người) gồm: phản ứng dị ứng nghiêm trọng như sưng tấy mặt, môi, lưỡi, và/hoặc họng, khó thở, hoặc phản ứng da (xảy ra < 1/1.000 người) gồm: buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, táo bón, đầy hơi, nôn mửa, ngứa, ban đỏ và/hoặc nóng, bóng ở da. Không phổ biến (xảy ra < 1/100 người) gồm: tăng canxi huyết) hoặc thải trừ canxi qua đường tiểu nhiều (tăng canxi niệu). **Chống chỉ định:** • Tiền sử dị ứng với một trong các thành phần của thuốc • Tăng canxi huyết, vôi hóa mô • Bất động lâu ngày kèm tăng canxi huyết và/hoặc tăng canxi niệu. **Thận trọng:** • Bệnh nhân suy thận: cần kiểm tra hàm lượng canxi trong nước tiểu và hàm lượng natri (275 mg trong mỗi viên nén sủi bọt) khi sử dụng cho bệnh nhân theo chế độ dinh dưỡng ít natri (ít muối) hoặc không có muối • Cũng nên chờ ít nhất 2 giờ sau khi dùng thuốc chứa biphosphonat, các cyclin hoặc estramustine với thời điểm uống viên sủi 500mg Calcium Sandoz. **Lưu ý đặc biệt:** Uống quá nhiều canxi có thể gây táo bón, vì vậy không được dùng cho bệnh nhân không dung nạp với fructose, hoặc kém hấp thu glucose và galactose hoặc cho người thiếu hụt enzyme lactase (hiếm gặp). **Có thai hoặc cho con bú:** Nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn trước khi dùng bất kỳ thuốc nào. Trường hợp thiếu canxi, bác sĩ của bạn có thể khuyên bạn mang thai hoặc cho con bú. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** **Nhà sản xuất:** Novartis Pharma (Pakistan) Ltd., Petaro Road, Jamshoro, Pakistan. **Nhà phân phối:** VPĐD Zuellig Pharma Pte Ltd. Tầng 5, 180 - 192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM. ĐT: 08 3910 2650. Số báo thuốc của cục QLD: ngày tháng năm In tài liệu ngày tháng năm

 **NOVARTIS**