




Naftidrofuryl cải thiện hiệu quả khoảng cách đi bộ tối đa¹



Tóm tắt thiết kế nghiên cứu:

Nhóm đánh giá phân tích theo hệ thống của bốn loại thuốc vận mạch: Cilostazol, Naftidrofuryl, Pentoxifylline và Inositol nicotinate được cấp phép để điều trị triệu chứng đau cách hồi ở người mắc bệnh động mạch ngoại biên.

Trong phân tích chính có loại trừ kết quả của inositol nicotinate bởi vì không có đầy đủ dữ liệu để đánh giá hiệu quả của thuốc này trong việc cải thiện khoảng cách đi bộ không đau và khoảng cách đi bộ tối đa từ các phân tích gộp.

Đánh giá hiệu quả lâm sàng dựa trên dữ liệu:

Cải thiện khoảng cách đi bộ tối đa của các nhóm thuốc so với giả dược.

Kết quả phân tích:

Naftidrofuryl oxalate cải thiện khoảng cách đi bộ tối đa so với giả dược là **60.3%**.

Kết quả với 2 nhóm Cilostazol và Pentoxifylline lần lượt là 24.6% và 10.6%.



Tài liệu tham khảo: 1. NICE technology appraisal guidance 223
2. T De Backer et all. BMJ (2009) 338:b603



Phy