




Naftidrofuryl cải thiện khoảng cách đi bộ ở bệnh nhân khập khiễng cách hồi có bệnh động mạch ngoại biên²



Tóm tắt nghiên cứu:

Một phân tích gộp trên 7 nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng với 1.266 bệnh nhân nhằm đánh giá hiệu quả của nhóm bệnh nhân sử dụng Naftidrofuryl so với giả dược trong điều trị triệu chứng ở bệnh nhân khập khiễng cách hồi có bệnh động mạch ngoại biên.

Tiêu chí đánh giá chính:

Cải thiện về khoảng cách đi bộ không đau.

Phân tích số liệu:

- Tiếp cận 1 bước: Cơ sở dữ liệu được xem như 1 bộ dữ liệu. Sử dụng mô hình tuyến tính hỗn hợp nhiều tầng.
- Tiếp cận 2 bước: Kết quả của mỗi nghiên cứu được rút ra rồi phân tích gộp. Tác giả tính sự cải thiện tương đối của mỗi nhóm điều trị trong mỗi nghiên cứu rồi sử dụng mô hình ngẫu nhiên thường quy của Der Simonian và Larid.

Kết quả nghiên cứu:

Bảng: Hiệu quả ước tính trong phân tích chính (n=1083) của phân tích gộp trên dữ liệu từng bệnh nhân riêng rẽ về hiệu quả của naftidrofuryl so với giả dược trong điều trị triệu chứng ở bệnh nhân khập khiễng cách hồi có bệnh động mạch ngoại biên:

Phân tích về tính cải thiện tương đối	Tiếp cận 1 bước	Tiếp cận 2 bước
Tỷ số cải thiện tương đối khoảng cách đi bộ không đau (95% CI)*	1,37 (1,27-1,49)	1,38 (1,24-1,56)
Tỷ số cải thiện tương đối khoảng cách đi bộ tối đa (95% CI)†	1,40 (1,19-1,63)	1,38 (1,18-1,61)

*Tỷ số khoảng cách đi bộ không đau sau khi sử dụng naftidrofuryl so với khoảng cách đi bộ sau khi sử dụng giả dược.
†Tỷ số khoảng cách đi bộ tối đa sau khi sử dụng naftidrofuryl so với khoảng cách đi bộ sau khi sử dụng giả dược.

- Tỷ số cải thiện tương đối khoảng cách đi bộ không đau của nhóm bệnh nhân sử dụng Naftidrofuryl so với giả dược là 1,37 (p<0,001).**
- Khoảng cách đi bộ tối đa của nhóm bệnh nhân sử dụng Naftidrofuryl so với giả dược là 1,40 (p=0,001).**

