

08:00


concerta

Điều trị Rối Loạn
Tăng Động Giảm Chú Ý (ADHD)
theo DSM-IV cho trẻ em,
thanh thiếu niên từ 6 - 17 tuổi
và người lớn từ 18 - 65 tuổi




Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

14:00



20:00

17:00



THÔNG TIN KÊ TOA

Tên thuốc gốc: Methylphenidate hydrochloride.

DANG BẢO CHẾ VÀ HẠM LƯỢNG: Viên nén phóng thích kéo dài - dùng đường uống: • 18 mg: Viên hình nhộng màu vàng, một mặt có in chữ "alza 18" màu đen. • 27 mg: Viên hình nhộng màu xám, một mặt có in chữ "alza 27" màu đen. • 36 mg: Viên hình nhộng màu trắng, một mặt có in chữ "alza 36" màu đen. • 54 mg: Viên hình nhộng màu nâu đỏ, một

hạn amphetamines có thể gây ức chế tăng trưởng tự hay không; tuy nhiên nên theo dõi khả năng tăng trưởng khi điều trị với các thuốc kích thích, và phải ngưng điều trị nếu bệnh nhân không phát triển hoặc có được cân nặng hay chiều cao như mong muốn. • **Rối loạn thị giác:** Khó điều tiết và nhìn mờ đã được báo cáo. • **Nguy cơ tác nghiệm đường tiêu hóa:** Viên thuốc CONCERTA® không bị biến dạng và không thay đổi hình dạng đáng kể trong đường tiêu hóa.