


CONCERTA® cải thiện rõ rệt các triệu chứng tăng động/xung động và giảm chú ý ở trẻ bị ADHD⁽³⁾

Nghiên cứu mở đánh giá hiệu quả OROS MPH trên 121 trẻ vị thành niên (12-18 tuổi) bị ADHD theo DSM IV trong 12 tuần. Liều khởi đầu 18mg và liều tối đa 72mg. K-ARS là thang điểm đánh giá các triệu chứng ADHD gồm 9 triệu chứng tăng động/xung động, 9 triệu chứng giảm chú ý. Mỗi triệu chứng được đánh giá bằng thang điểm từ 0 -> 4 (0: không có, 4: rất nhiều). Điểm càng cao thì mức độ rối loạn càng nặng.



Thay đổi điểm K-ARS trong suốt 12 tháng điều trị với OROS® MPH.




DSM-IV: Sổ tay chẩn đoán và thống kê các rối loạn tâm thần lần thứ IV của hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ.

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder): Rối loạn tăng động giảm chú ý

*OROS: Osmotic Release Oral System: Phóng thích bằng áp lực thẩm thấu.

CONCERTA® giúp trẻ tập trung hơn trong học tập⁽⁴⁾



Nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi, chuyển đổi nhóm, có đối chứng với giả dược, tiến hành trên 135 trẻ em (từ 9 - 12 tuổi) bị ADHD trong 12 tuần, có hay không có khả năng học trong môn đọc, toán hay cả hai. Liều dùng của OROS MPH: 18mg, 36mg, 54mg.

SKAMP: Thang điểm có 10 mục, do giáo viên đánh giá về các hành vi đặc trưng ở trong lớp học bao gồm mức độ tập trung và các hành vi, theo 7 thang điểm từ 0-6 (0: không có và 6: rất nhiều). Điểm càng cao thì mức độ rối loạn càng nặng.

*OROS: Osmotic Release Oral System: Phóng thích bằng áp lực thẩm thấu.



ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder): Rối loạn tăng động giảm chú ý