



31/7/2014

GIẢM CẢM CÚM

Giảm nhức đầu, sổ mũi, hắt hơi...



**GIẢM CẢM CÚM,
HẾT MỆT MỎI**

Nên dùng ban đêm khi nghỉ ngơi (*)

Nên dùng ban ngày khi làm việc (**)

THÀNH PHẦN: Decolgen Forte: Paracetamol (Acetaminophen) 500mg, Phenylephrine Hydrochloride 10mg, Chlorpheniramine Maleate 2mg. Decolgen ND: Paracetamol (Acetaminophen) 500mg, Phenylephrine Hydrochloride 10mg. **CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các triệu chứng cảm thông thường, viêm mũi dị ứng, viêm mũi vãn mạch, viêm màng nhầy xuất tiết do cúm, viêm xoang và các rối loạn của đường hô hấp trên. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG** (uống 3 hay 4 lần một ngày sau khi ăn) Người lớn 1-2 viên/ lần, Trẻ em: 2 - 6 tuổi 1/2 viên/ lần, 7 - 12 tuổi 1/2-1 viên/ lần hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH** Không dùng với bệnh nhân: nhạy cảm với các thành phần của thuốc, suy gan, thận nặng, tăng huyết áp, hen cấp, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, block nhĩ thất, xơ cứng động mạch nặng, nhịp nhanh thất, cường giáp nặng, glôcôm góc đóng. **THẬN TRỌNG:** Cũng như các thuốc cường giao cảm khác, nên sử dụng thận trọng cho những bệnh nhân bị cường giáp, đái tháo đường, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Đôi khi có những phản ứng da gồm ban dát sẩn ngứa và mày đay. Paracetamol (acetaminophen) có liên quan với nguy cơ gây phản ứng da nghiêm trọng hiếm gặp. Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, và hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên da đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá mẫn cảm nào khác, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. Ngoài ra Decolgen Forte có thể gây buồn ngủ, các bệnh nhân nên lưu ý khi lái xe hoặc hoạt động trong các lĩnh vực cần sự nhanh nhẹn. Cần thận trọng khi dùng Phenylephrine cho người cao tuổi, người bệnh cường giáp, nhịp tim chậm, block tim một phần, bệnh cơ tim, xơ cứng động mạch nặng, đái tháo đường type 1. (*) Decolgen Forte có thể gây buồn ngủ bệnh nhân nên dùng khi cần tập trung làm việc. **TÁC DỤNG PHỤ:** Paracetamol (acetaminophen) tương đối không độc ở liều điều trị. Phản ứng ngoài da gồm ban dát sẩn ngứa và mày đay hiếm khi được ghi nhận. Paracetamol (acetaminophen) thường được dung nạp tốt. Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đỏ hoặc mày đay, nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thương tổn niêm mạc. Thuốc có thể gây kích thích thần kinh trung ương nhẹ, đặc biệt ở những bệnh nhân quá mẫn cảm với các tác động của thuốc cường giao cảm. Ngoài ra đối với Decolgen Forte: tác dụng an thần trong khi dùng thuốc. **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Việc sử dụng thuốc an toàn trong khi mang thai chưa được chứng minh. Thuốc có thể đi vào sữa mẹ do đó không nên sử dụng cho những phụ nữ đang cho con bú do trẻ sơ sinh có thể quá nhạy cảm với tác động của thuốc. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.** Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA, Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, ĐT: 08-39621000. Số giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: xxxx/xx/QLD-TT, in tài liệu: ngày ...tháng... năm



Decolgen®