



31/7/2014

GIẢM CẢM CÚM

Giảm nhức đầu, nghẹt mũi, đau, sốt...



GIẢM CẢM CÚM, HẾT MỆT MỎI



THÀNH PHẦN: Mỗi viên **Decolgen® ND** chứa Paracetamol (Acetaminophen) 500mg, Phenylephrine Hydrochloride 10mg. **CHỈ ĐỊNH:** Điều trị các triệu chứng cảm thông thường, viêm mũi dị ứng, viêm mũi vận mạch, viêm màng nhầy xuất tiết do cúm, viêm xoang và các rối loạn của đường hô hấp trên. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG** (uống 3 hay 4 lần một ngày, sau khi ăn) Người lớn 1-2 viên/ lần, Trẻ em: 2 - 6 tuổi 1/2 viên/ lần, 7 - 12 tuổi 1/2-1 viên/lần hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Nhạy cảm với bất cứ thành phần nào có trong công thức. Bệnh nhân suy gan, suy thận nặng, bệnh tim mạch nặng, nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, tăng huyết áp nặng, block nhĩ thất, xơ cứng động mạch nặng, nhịp nhanh thất, cường giáp nặng, glôcôm góc đóng. **THẬN TRỌNG:** Paracetamol (acetaminophen) tương đối không độc với liều điều trị. Đôi khi có những phản ứng da gồm ban dát sẩn ngứa và mề dáy. Paracetamol (acetaminophen) có liên quan với nguy cơ gây phản ứng da nghiêm trọng hiếm gặp. Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, và hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên da đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá mẫn cảm nào khác, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. Những phản ứng mẫn cảm khác gồm phù thanh quản, phù mạch, và những phản ứng kiểu phản vệ có thể ít khi xảy ra. Cần thận trọng khi dùng Phenylephrine cho người cao tuổi, người bệnh cường giáp, nhịp tim chậm, block tim một phần, bệnh cơ tim, xơ cứng động mạch nặng, đái tháo đường type 1. Decolgen ND không gây buồn ngủ bệnh nhân nên dùng khi cần tập trung làm việc. **TÁC DỤNG PHỤ:** Paracetamol (acetaminophen) thường được dung nạp tốt. Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra. Thường là ban đỏ hoặc mề dáy, nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thương tổn niêm mạc. Phenylephrine có thể gây kích thích thần kinh trung ương nhẹ, đặc biệt ở những bệnh nhân quá mẫn cảm với các tác động của thuốc cường giao cảm. Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc. **SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Việc sử dụng thuốc an toàn trong khi mang thai chưa được chứng minh. Thuốc có thể đi vào sữa mẹ do đó không nên sử dụng cho những phụ nữ đang cho con bú do trẻ sơ sinh có thể quá nhạy cảm với tác động của thuốc. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.** Sản xuất tại: CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA, Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II, Phường Hoà Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, ĐT: 08-39621000. Số giấy tiếp nhận hồ sơ quảng cáo thuốc của Cục Quản lý dược: xxxx/xx/QLD-TT, in tài liệu: ngày ...tháng... năm ...



Decolgen®