

Rosepire

Drospirenone 3mg/ Ethinylestradiol 20 mcg


CHEMO

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THÀNH PHẦN: Vi 28 viên, mỗi viên nén bao phim hoạt tính (màu hồng) chứa: Drospirenone 3mg; Ethinylestradiol 0.02mg. Mỗi viên giả được (màu trắng) không chứa hoạt chất. **CHỈ ĐỊNH:** Thuốc tránh thai đường uống, có tác dụng tốt đối với những phụ nữ có tiền sử bị giữ nước do hormone đồng thời có tác dụng điều trị mụn trứng cá và tăng tiết nhiều bã nhờn trên da. **LIỀU DÙNG & CÁCH DÙNG:** Dùng đường uống. Thuốc phải được uống hàng ngày vào những giờ nhất định, liên tục, mỗi ngày một viên trong 28 ngày liên tiếp. Vi thuốc tiếp theo được bắt đầu sau ngày hết viên cuối cùng của vi trước. Chu kỳ kinh nguyệt thường bắt đầu vào ngày thứ 2-3 sau khi uống viên placebo (viên thuốc màu trắng) và có thể chưa kết thúc trước khi dùng vi tiếp theo. Bắt đầu dùng thuốc: Không dùng phương pháp tránh thai bằng hormon (thăng trước): Bắt đầu uống thuốc vào ngày thứ nhất của chu kỳ kinh nguyệt. Thay đổi thuốc tránh thai kết hợp đường uống khác: Bắt đầu dùng thuốc vào ngày sau khi dùng hết viên placebo hoặc sau thời gian dừng thuốc thường lệ của vi thuốc tránh thai trước. Có thể bắt đầu vào ngày bất kỳ khi bạn đang chỉ sử dụng progesteron (nếu đang cây hoặc đang dùng vòng tránh thai, dùng thuốc vào ngày tháo ra, nếu đang tiêm dùng thuốc vào ngày phải tiêm tiếp theo). Với tất cả các phương pháp trên sau khi thay đổi nên sử dụng thêm 1 phương pháp tránh thai cơ học trong 7 ngày đầu dùng thuốc. Sau khi sảy thai ở 3 tháng đầu thai kỳ: Uống thuốc ngay lập tức, khi đó không phải dùng thêm một phương pháp tránh thai nào khác. Sau khi sinh hoặc sau khi sảy thai ở 3 tháng giữa của thai kỳ: Bắt đầu dùng thuốc vào ngày thứ 21 đến 28 sau khi sinh hoặc sau khi sảy thai ở giai đoạn thứ 2. Nếu bắt đầu muộn hơn, nên dùng thêm một phương pháp tránh thai cơ học trong 7 ngày đầu. Nếu bạn đã quan hệ tình dục, phải loại trừ trường hợp có thai trước khi bạn uống thuốc tránh thai kết hợp hoặc phải đợi đến kỳ kinh nguyệt đầu tiên. Khi quên thuốc: Nếu quên viên thuốc placebo thì sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Bạn nên bỏ viên thuốc placebo đã quên, không kéo dài tuần uống viên placebo. Nếu bạn quên uống viên thuốc có chứa hoạt chất: Nếu chỉ quên ít hơn 12 giờ sau khi uống thuốc, tác dụng tránh thai không bị giảm. Nên uống thuốc ngay khi bạn nhớ ra và uống viên tiếp theo như thường lệ. Nếu quên nhiều hơn 12 giờ sau khi uống thuốc, tác dụng tránh thai có thể bị giảm. Phải tuân theo các hướng dẫn sau: Không nên ngừng uống thuốc lâu hơn 7 ngày. Trong 7 ngày không uống thuốc liên tục, bạn nên tuân theo những chỉ dẫn dưới đây: Tuần đầu tiên: Uống viên thuốc bạn quên ngay sau khi nhận ra, có thể uống 2 viên cùng lúc. Tiếp tục uống những viên sau như thường lệ và sử dụng thêm một phương pháp tránh thai khác như sử dụng bao cao su trong 7 ngày tiếp theo. Nếu bạn đã quan hệ tình dục vào tuần trước khi bạn quên uống thuốc, có thể bạn đã có thai. Viên thuốc bạn quên càng gần với ngày uống viên placebo, tỷ lệ có thai càng cao. Tuần thứ 2: Uống viên thuốc bạn quên ngay sau khi nhận ra, có thể uống 2 viên cùng lúc. Sau đó tiếp tục uống thuốc như thường lệ. Nếu chắc chắn rằng bạn đã uống thuốc đúng trong 7 ngày trước khi quên thuốc thì không cần dùng thêm một phương pháp tránh thai khác. Nếu bạn quên uống nhiều hơn 1 viên thuốc, nên dùng thêm phương pháp tránh thai trong 7 ngày. Tuần thứ 3: Nguy cơ có thai giảm. Sự thay đổi thời gian uống thuốc, khả năng tránh thai có thể giảm. Không cần thiết phải dùng thêm một phương pháp tránh thai nào thêm, với điều kiện là 7 ngày trước khi quên uống viên thuốc đầu tiên phải uống thuốc tránh thai đầy đủ và đúng. Nếu không bạn có thể lựa chọn một trong 2 cách sau và dùng thêm một phương pháp tránh thai trong 7 ngày: Uống viên thuốc bạn quên ngay sau khi nhớ ra, có thể uống 2 viên cùng lúc. Tiếp tục uống thuốc như thường lệ. Vi tiếp theo bắt đầu ngay khi vi trước kết thúc, không có khoảng nghỉ (không uống 7 viên giả được). Sẽ không có kinh nguyệt cho tới khi uống viên có hoạt chất cuối cùng ở vi thứ 2, nhưng có thể chảy vài giọt máu trong thời gian uống thuốc. 2. Không uống viên thuốc có hoạt chất ở vi hiện tại. Bạn nên nghỉ uống thuốc trong 7 ngày hoặc uống viên placebo trong 7 ngày bao gồm cả ngày quên uống thuốc và tiếp tục uống vi tiếp theo. Nếu bạn quên uống thuốc và