

PROSPAN®


THUỐC HO CHO CẢ GIA ĐÌNH



Thành phần: mỗi 100ml dung dịch chứa hoạt chất: Cao lá thường xuân khô 0,7g. Tá dược: nước tinh khiết, kali sorbate, citric acid khan, xathan gum, aroma, sorbitol dung dịch 70%. **Chỉ định:** viêm đường hô hấp cấp có kèm ho, dùng để điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính. **Chống chỉ định:** Những trường hợp bất dung nạp fructose. **Thận trọng:** phụ nữ có thai và cho con bú: Bởi vì tính an toàn của thuốc trên phụ nữ có thai vẫn chưa được xác định, do đó chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú dưới sự chỉ dẫn và kê toa của bác sĩ. **Tác dụng không mong muốn:** tuy hiếm gặp, nhưng Prospan cũng có thể gây tác dụng nhuận tràng do thuốc có chứa sorbitol. **Tương tác thuốc:** người ta vẫn chưa phát hiện được việc uống chung Prospan với các thuốc khác có gây ra những tác dụng phụ không mong muốn hay không, vì vậy việc sử dụng Prospan đồng thời với các thuốc khác ví dụ như kháng sinh là an toàn. **Liều dùng và cách dùng:** Trẻ sơ sinh và trẻ em: 2,5ml x 3 lần/ngày. Trẻ ở độ tuổi đi học và thiếu niên: 5ml x 3 lần/ngày. Người lớn : 5-7ml x 3 lần/ngày. **Thời gian điều trị:** ít nhất một tuần hoặc duy trì 2 - 3 ngày sau khi hết triệu chứng.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Số Giấy xác nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo của Cục Quản lý Dược: XXXX/XX/QLD-TT, ngày....tháng....năm....
Ngày....tháng....năm....in tài liệu



Nhà sản xuất



ENGELHARD
Arzneimittel

Nhà phân phối



SOHACO
Group

4/9/14

Phz