


(*) Thông tin này chỉ dùng để tham khảo

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế




Giảm đau và kháng viêm hiệu quả ^{1(*)}

MELOXICAM: HIỆU QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM KHỚP DẠNG THẤP ^{4(*)}




Nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, giả đôi, nhóm song song, đa trung tâm trong 12 tuần trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp được chỉ định meloxicam 7,5 mg; 15 mg (1 lần/ngày) so với giả được và diclofenac 75 mg (2 lần/ngày)

MELOXICAM: ÍT GÂY RA CÁC PHẢN ỨNG PHỤ TRÊN ĐƯỜNG TIÊU HÓA ^{1,5(*)}



Độ dung nạp trên đường tiêu hóa của meloxicam 7,5 mg ($n=10199$) và meloxicam 15 mg ($n=977$) so với diclofenac 100 mg ($n=5396$) và placebo ($n=294$) trên bệnh nhân thoái hóa khớp được quan sát trong các nghiên cứu lâm sàng mù đôi.

TẦN SUẤT BIẾN CỐ THUYỀN TẮC ^{6(*)}



Tần suất biến cố thuyên tắc do huyết khối được báo cáo từ dữ liệu theo dõi biến cố kèm theo việc kê toa (PEM) tại Anh quốc. ^{6(*)}

Handwritten signature and date: 18/10/2013



Boehringer
Ingelheim