




HIỆU QUẢ GIẢM NGUY CƠ TỬ VONG[†] TRONG ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP[†]

TICAGRELOR: GIẢM 21% NGUY CƠ TỬ VONG TIM MẠCH SAU 12 THÁNG[†]




21%
RRR


NNT=91

RRR: Độ giảm nguy cơ tương đối
NNT: Số lượng bệnh nhân cần điều trị

**TICAGRELOR: GIẢM TÁI PHÁT BIẾN CỐ TIM MẠCH
NGAY TỪ NGÀY THỨ 30 VÀ TIẾP TỤC CẢI THIẾN TỚI 12 THÁNG[†]**



12%
RRR



16%
RRR

NNT=54

RRR: Độ giảm nguy cơ tương đối
NNT: số lượng bệnh nhân cần điều trị

Nghiên cứu PLATO: ngẫu nhiên, mù đôi, đa trung tâm, so sánh song song hiệu quả phòng ngừa biến cố tim mạch của ticagrelor (liều nạp 180mg, liều duy trì 90mg 2 lần/ngày) và clopidogrel (liều nạp từ 300 tới 600mg, liều duy trì 75 mg 1 lần/ngày) trên 18624 bệnh nhân nhập viện do Hội chứng mạch vành cấp trong 12 tháng.