




Bệnh Trĩ



Suy Tĩnh Mạch Chân

đã có **Ginkor FORT®**



↪ Giảm nhanh các triệu chứng **SUY TĨNH MẠCH:**

- ✓ Viêm, đau, phù nề
- ✓ Nặng chân, hội chứng căng chân rung

↪ Giảm nhanh các triệu chứng **BỆNH TRĨ:**

- ✓ Đau, nóng, rát, rỉ dịch
- ✓ Chảy máu trực tràng



Handwritten signature and date: 25/2/14

HÌNH THỨC TRÌNH BÀY: Viên nang. Hộp 30 viên nang đóng vỉ. **THÀNH PHẦN:** Cho mỗi viên nang 0,625g: - Hoạt chất: Chiết xuất lá Ginkgo biloba được chuẩn hóa và chuẩn độ chứa 24% hétérosides Ginkgo và 6% Ginkgolides – bilobalide 0,014g. Heptaminol chlorhydrat (DCI) 0,300g. Troxérutine (DCI) 0,300g - Tá dược: Stéarate magnesium, acid silicic. **TÍNH CHẤT DƯỢC LÝ:** Ginkor Fort là chất trợ tĩnh mạch và bảo vệ mạch máu, làm tăng trương lực tĩnh mạch, sức bền mạch máu và giảm tính thấm của mao mạch. Những tác dụng này kết hợp với tính ức chế tại chỗ đối với các chất trung gian gây đau (histamine, bradykinin, sérotonin), men tiêu thể và gốc tự do gây viêm và thoái hóa sợi collagen. Ginkor Fort giúp cho máu tĩnh mạch trở về tim phải dễ dàng hơn nhờ trong công thức có Heptaminol chlorhydrat. **TÍNH CHẤT DƯỢC ĐỘNG HỌC:** Do các hoạt chất chính được phối hợp nên không nghiên cứu được động học trên người. **CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:** Điều trị các triệu chứng có liên quan đến suy tĩnh mạch bạch huyết (nặng chân, đau, hội chứng căng chân rung). Điều trị các dấu hiệu chức năng có liên quan đến bệnh trĩ. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Suy tĩnh mạch bạch huyết: 2 viên nang mỗi ngày (1 viên lúc buổi sáng và 1 viên vào buổi tối). Cơn trĩ cấp: điều trị tấn công: 3 đến 4 viên nang mỗi ngày trong 7 ngày vào các bữa ăn, điều trị duy trì 2 viên mỗi ngày trong 2 tuần tiếp theo. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không dùng cho những trường hợp có liên quan đến Heptaminol: cường giáp, phối hợp với IMAO (nguy cơ tăng huyết áp bộc phát). **THẬN TRỌNG:** Do có Heptaminol nên theo dõi huyết áp khi bắt đầu điều trị cho những bệnh nhân bị cao huyết áp nặng. Trong cơn trĩ cấp: việc sử dụng thuốc không thay thế được cho các biện pháp điều trị các bệnh khác ở hậu môn. Điều trị không nên kéo dài. Nếu triệu chứng không giảm nhanh chóng, nên khám lại hậu môn trực tràng và xem xét lại cách điều trị. Với các vận động viên: thuốc có chứa heptaminol có thể gây kết quả dương tính với các test doping. Nếu có nghi ngờ, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ. **QUÁ LIỀU:** Trong trường hợp dùng quá liều do vô tình hay cố ý nên cho bệnh nhân nhập viện để theo dõi huyết áp và nhịp tim. **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Các thực nghiệm trên động vật không cho thấy tác dụng gây quái thai. Ở người do không có nghiên cứu trên ba tháng đầu của thai kỳ nên nguy cơ chưa biết rõ. Tuy nhiên cho đến giờ chưa thấy có tác dụng gây dị dạng. Phụ nữ cho con bú: do chưa rõ thuốc có được tiết vào sữa hay không nên không nên dùng thuốc khi đang nuôi con bằng sữa mẹ. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Không dùng chung với IMAO do có nguy cơ cao huyết áp từng hồi do sự hiện diện của heptaminol. Trong trường hợp nghi ngờ, nên hỏi ý kiến của Bác sĩ điều trị hay Dược sĩ. **TÁC DỤNG PHỤ:** Cho đến thời điểm này chưa phát hiện thấy tác dụng phụ. Thông báo cho Bác sĩ hay Dược sĩ những tác dụng phụ gặp phải khi sử dụng thuốc.

• **BẢO QUẢN:** BẢO QUẢN Ở NƠI KHÔ RÁO, DƯỚI 30°C. • **ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM.** • **KHÔNG DÙNG QUÁ THỜI HẠN ĐƯỢC GHI TRÊN HỘP THUỐC.** • **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.** • **MUỐN BIẾT THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ ĐIỀU TRỊ HAY DƯỢC SĨ.** • Hạn dùng: 3 năm - Xuất xứ: Pháp. • Tiêu chuẩn sản xuất: Nhà sản xuất. • Giấy phép bán trên thị trường (AMM) Pháp: 330 432.1

Giấy đăng ký: Beaufour Ipsen Pharma - 24, rue Erlanger - 75016 Paris - FRANCE.
BEAUFOUR IPSEN Industrie - rue Ethe Virtou - 28100 Dreux - FRANCE.

Số Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài liệu thông tin thuốc của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế:/...../QLD-TT, ngày: tháng năm 2013
Ngày tháng năm 20..... in tài liệu
Tài liệu gồm 1 trang