

ZYVOX®
(linezolid)

VĂN PHÒNG
ĐẠI DIỆN
TẠI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
PRIZER (THAILAND) LIMITED THAILAND

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế

07/5/2016

KHÔNG CẦN CHỈNH LIỀU TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI
KHÔNG CẦN CHỈNH LIỀU TRÊN BỆNH NHÂN SUY THẬN



THÔNG TIN KẾT TOA

TÊN THUỐC: ZYVOX® - **THÀNH PHẦN:** 600 mg linezolid / 300 mL. Là dược: natri citrat dihydrat, acid citric (dạng khan), glucose monohydrat, acid hydrocloric, natri hydroxid, nước cất pha tiêm. **DẠNG BAO CHẾ:** Dung dịch truyền. **CHỈ ĐỊNH:** Linezolid được chỉ định điều trị các nhiễm khuẩn sau đây bao gồm cả các trường hợp có nghi ngờ hoặc đã xác định có nhiễm khuẩn huyết đồng thời, do các chủng vi khuẩn hiếu khí hoặc kỵ khí Gram (+) nhạy cảm gây ra. Điều trị phối hợp có thể được chỉ định trên lâm sàng trong trường hợp vi khuẩn gây bệnh bao gồm cả các chủng vi khuẩn Gram (-). Linezolid chỉ có tác dụng trên các vi khuẩn Gram (+). Linezolid không có hoạt tính trên các chủng vi khuẩn gây bệnh Gram (-). Cần sử dụng liều pháp có tác dụng đặc hiệu trên các vi khuẩn Gram (-) trong trường hợp đã xác định hoặc nghi ngờ nhiễm đồng thời vi khuẩn Gram (-). Viêm phổi bệnh viện, Viêm phổi mắc phải tại cộng đồng, Nhiễm khuẩn da và mô mềm nặng có biến chứng, Nhiễm khuẩn gây bởi *Enterococcus faecium* đã kháng vancomycin, bao gồm cả những trường hợp có nhiễm khuẩn huyết đồng thời.

công thức máu hoặc đang dùng các thuốc gây rối loạn công thức máu, dùng linezolid hơn 10-14 ngày; bệnh nhân lớn tuổi; suy thận nặng có huyết không thấm tách máu. Phải ngưng linezolid, nếu cần tiếp tục phải giám sát chặt chẽ công thức máu và quản lý cả bệnh hợp lý. **Chống chỉ định về tử vong trong một thử nghiệm lâm sàng ở những bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn Gram (+) liên quan đến ống thông:** đối với nhiễm khuẩn da-mô mềm có biến chứng, chỉ dùng linezolid khi đã xác định hoặc nghi ngờ có nhiễm đồng thời vi khuẩn Gram (-) nếu không có lựa chọn nào khác; khởi đầu điều trị cùng với thuốc kháng vi khuẩn Gram (-). **Tiểu chảy và viêm đại tràng liên quan kháng sinh:** ngưng linezolid và có biện pháp điều trị phù hợp, không dùng thuốc ức chế nhu động ruột. **Nhiễm acid lactic:** cần xử lý ngay triệu chứng: buồn nôn, nôn, đau bụng, bicarbonat thấp, tăng thông khí. Cần nhắc lại lịch và nguy cơ nếu tiếp tục dùng linezolid. Suy chức năng ty thể: nhiễm lactic, thiếu máu, rối loạn thần kinh thị giác, ngoại biên, các biến cố tăng khi dùng thuốc trên 28 ngày. **Hội chứng serotonin:** khi cần dùng cùng với các