



Abbott

HIDRASEC®
10 mg Infants

HIDRASEC®
30 mg Children

ĐIỀU TRỊ TRIỆU CHỨNG TIÊU CHẢY CẤP™

Ở trẻ trên 3 tháng tuổi cùng với việc bù nước bằng đường uống^{m)}

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Hidrasc®: Hidrasec® 10mg Infants; Hidrasec® 30mg Children. Hidrasec® dạng bột cầm dính để uống, bột màu trắng và có hương trái cây. Mỗi gói Hidrasec® Infants chứa 10 mg racecadotril. Mỗi gói Hidrasec® Children chứa 30 mg racecadotril. Tác dụng (thành phần không phải là thuốc): Sucrose, keo silica khan, 30% polyacrylate dạng phân tán, vị ngọt. **CHỈ ĐỊNH:** Hidrasec® được chỉ định bổ sung, điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp ở trẻ nhỏ (trên 3 tháng tuổi) và trẻ em cùng với việc bù nước bằng đường uống. Trong trường hợp điều trị được nguyên nhân gây tiêu chảy, có thể sử dụng racecadotril như một liệu pháp điều trị bổ sung. **LƯU Ý:** LƯU Ý



Thuốc bột vị ngọt, hương trái cây
Liều dùng: 1,5mg/kg/ lần x 3 lần/ngày

Không khuyến nghị dùng sản phẩm này cho trẻ sơ sinh dưới 3 tháng tuổi vì không có thử nghiệm lâm sàng nào được thực hiện trên đối tượng này. Không khuyến nghị dùng sản phẩm này cho bất kỳ trẻ nhỏ nào bị bệnh gan hoặc thận không kể mức độ nghiêm trọng của bệnh như thế nào, vì không có đủ thông tin trên các đối tượng bệnh nhân này. Hidrasec® cũng có thể không có tác dụng (giảm sinh khả dụng) nếu trẻ bị nôn kéo dài hoặc nôn không kiểm soát được. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Không có tương tác thuốc nào được mô tả ở người cho đến nay. Cả loperamide và

Đã ký 20/5/2016