



Khi bạn hay con bạn có đàm? Có đàm? Khi bạn hay con bạn có đàm? Bisolvon. Hết đàm, sẽ hết ho hời!



88 108/2015



Bisolvon - Thuốc ho long đàm



THÀNH PHẦN: Bisolvon: 8mg bromhexine HCl/viên; Bisolvon Kids: 4mg bromhexine HCl/5ml si rô. **CHỈ ĐỊNH:** Làm loãng đờm trong các bệnh phế quản phổi cấp và mạn tính có kèm theo sự tiết chất nhầy bất thường và sự vận chuyển chất nhầy suy yếu. **LIỀU LƯỢNG & CÁCH DÙNG:** Bisolvon: Người lớn và trẻ > 12 tuổi: 1 viên x 3 lần/ngày; có thể tăng đến 6 viên/ngày ở người lớn khi bắt đầu điều trị; trẻ em 6-12 tuổi: ½ viên x 3 lần/ngày; trẻ nhỏ 2-6 tuổi: ½ viên x 2 lần/ngày. Bisolvon Kids: Người lớn và trẻ > 12 tuổi: 10ml x 3 lần/ngày; trẻ 6-12 tuổi: 5ml x 3 lần/ngày; trẻ 2-6 tuổi: 2,5ml x 3 lần/ngày; trẻ < 2 tuổi: 1,25ml x 3 lần/ngày. Thời gian điều trị Bisolvon si rô không quá 8-10 ngày mà không hỏi ý kiến bác sỹ. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Bệnh nhân quá mẫn với bromhexine hoặc các thành phần khác của thuốc; bệnh di truyền hiếm gặp có thể không dung nạp với một tá dược. **THẬN TRỌNG:** Rất ít tổn thương da nghiêm trọng như hội chứng Stevens Johnson và hoại tử biểu bì nhiễm độc. Tham khảo ý kiến bác sỹ và ngừng thuốc nếu xuất hiện tổn thương mới ở da và niêm mạc. Bisolvon chứa 222mg lactose cho tổng liều tối đa/ngày. Không dùng cho bệnh nhân bất dung nạp với galactose. Bisolvon Kids chứa 17,142g sorbitol cho tổng liều tối đa/ngày. Không dùng cho bệnh nhân bất dung nạp với fructose. Có thể nhuận tràng nhẹ. Bisolvon Kids: Nên thận trọng khi sử dụng đồng thời Bisolvon si rô và các thuốc ức chế ho. Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân loét dạ dày và hen, những bệnh nhân là người cao tuổi, suy nhược hoặc quá yếu mà không có khả năng khạc đờm. Hết sức thận trọng khi sử dụng Bisolvon ở những bệnh nhân suy thận hoặc suy gan nặng. **TÁC DỤNG PHỤ:** Tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đau bụng trên; phản ứng phản vệ: sốc phản vệ, phù mạch, co thắt phế quản, phát ban, mày đay, ngứa và các phản ứng quá mẫn khác. **CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Không nên dùng Bisolvon trong thời kỳ mang thai và thời gian cho con bú. **KHẢ NĂNG SINH SẢN:** Dựa trên kinh nghiệm tiền lâm sàng, không có dấu hiệu cho thấy bromhexine có thể tác động đến khả năng sinh sản. **ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE & VẬN HÀNH MÁY MÓC:** chưa nghiên cứu. **SẢN XUẤT:** Bisolvon, Bisolvon Kids: PT.Boehringer Ingelheim Indonesia, Jl.Lawang Gintung No.89, Bogor, Indonesia. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. MỌI THÔNG TIN SẢN PHẨM XIN LIÊN HỆ:** Lầu 14 – Kumho Asiana Plaza, 39 Lê Duẩn – Quận 1- Tp. HCM. Tel: (08) 3823 6919 – Fax: (08) 3823 6916. Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược – Bộ Y tế: XXXX/XX/QLD-TT, ngày... tháng... năm... Ngày... tháng... năm... in tài liệu.

