

R_x Ocugold

Lutein / Zeaxanthin 3.2 mg + Carotenoids giàu Beta-Carotene thiên nhiên 1.2 mg + Cao Carrot 100 mg

thay đổi thấp giữa các đối tượng. Sự hấp thu β -Carotene bị ảnh hưởng bởi carotenoid khác.

Nồng độ huyết tương của β -Carotene tăng hay giảm phụ thuộc vào đối tượng (Klositic et al, 1995).

Chỉ định:

Được chỉ định trong trường hợp thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi do nguyên nhân khác quan.

Chống chỉ định:

Chống chỉ định dùng Ocugold cho những bệnh nhân được biết dị ứng với cà rốt, nước uống có cà rốt, hoa vạn thọ hoặc các thành phần khác.

Lưu ý: Thoái hóa điểm vàng do di truyền sẽ không đáp ứng với liệu pháp điều trị này.

Liều dùng và cách sử dụng:

Một viên OCUGOLD mỗi lần, 2 lần mỗi ngày. Uống sau bữa ăn.

Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi dùng:

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên thử bằng chế độ ăn trái cây và rau quả từ 5 lần hoặc hơn mỗi ngày để nhận được Lutein và zeaxanthin. Lòng đỏ trứng gà rất giàu lutein và zeaxanthin, và phụ nữ mang thai và cho con bú, những người không gặp vấn đề khi có nồng độ cholesterol cao, nên dùng thêm trứng trong các bữa ăn.

Viên bổ sung Lutein và zeaxanthin không nên dùng cho trường hợp điều trị thiếu hụt vitamin A, vì những carotenoid này không chuyển hóa thành vitamin A.

Tác dụng phụ:

Chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc.

Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ gặp phải khi dùng thuốc.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ mang thai và cho con bú nên thử bằng chế độ ăn trái cây và rau quả từ 5 lần hoặc hơn mỗi ngày để nhận được Lutein và zeaxanthin. Lòng đỏ trứng gà rất giàu lutein và zeaxanthin, và phụ nữ mang thai và cho con bú, những người không gặp vấn đề khi có nồng độ cholesterol

cao, nên dùng thêm trứng trong các bữa ăn.

Ảnh hưởng lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Hiện chưa rõ tác dụng của thuốc khi dùng cho người lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc:

Thuốc:

Cholestyramine: Dùng đồng thời lutein/zeaxanthin và cholestyramin có thể làm giảm sự hấp thu của các carotenoid này.

Coleslipol: Dùng đồng thời lutein/zeaxanthin và coleslipol có thể làm giảm sự hấp thu của các carotenoid này.

Dầu vô cơ: Dùng đồng thời dầu vô cơ và lutein/zeaxanthin có thể làm giảm sự hấp thu của các carotenoid này.

Orlistat: Orlistat có thể làm giảm sự hấp thu của lutein/zeaxanthin.

Các chất dinh dưỡng bổ sung:

Beta-carotene: Dùng đồng thời beta-carotene và lutein có thể làm giảm hấp thu của các carotenoid này.

Triglycerides chuỗi trung gian: Dùng đồng thời triglyceride chuỗi trung gian và lutein/zeaxanthin có thể làm tăng hấp thu của các carotenoid này.

Pectin: Dùng đồng thời pectin và lutein/zeaxanthin có thể làm giảm hấp thu của các carotenoid này.

Thực phẩm:

Dầu: Một vài loại dầu ăn, như là dầu ngũ cốc, có thể làm tăng hấp thu của lutein/ zeaxanthin, đặc biệt là những dạng ester của các carotenoid này.

Olestra: Dùng đồng thời olestra và lutein/zeaxanthin có thể làm giảm hấp thu của các carotenoid này.



Trong điều trị thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi do nguyên nhân khác quan

ajanta

SVAN
09/01/2016