

Thông tin thuốc

Tài liệu thông tin cho cán bộ y tế



VIAGRA®

VIAGRA®

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim

THÀNH PHẦN ĐỊNH LƯỢNG VÀ ĐỊNH TÍNH

VIAGRA 50 mg: Mỗi viên chứa sildenafil citrate tương đương với 50 mg sildenafil. **VIAGRA 100 mg:** Mỗi viên chứa sildenafil citrate tương đương với 100 mg sildenafil.

- **CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:** Sildenafil dùng để điều trị các tình trạng rối loạn cương dương, là tình trạng không có khả năng đạt được hoặc duy trì cương cứng đủ để thỏa mãn hoạt động tình dục. Sildenafil chỉ có tác dụng khi có kích thích tình dục kèm theo.

LIỀU DÙNG

- **Đối với người lớn (trên 18 tuổi):** Hầu hết được khuyến cáo dùng liều 50 mg, uống trước khi quan hệ tình dục khoảng 1 giờ. Dựa trên sự dung nạp và tác dụng của thuốc, liều có thể tăng lên tới mức tối đa là 100 mg hoặc giảm tới mức 25 mg. Liều khuyến cáo tối đa là 100 mg, số lần dùng tối đa là 1 lần mỗi ngày.

- **Đối với bệnh nhân suy thận:** Không cần điều chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận nhẹ hoặc trung bình. Trường hợp suy thận nặng, nên dùng liều 25 mg. **Đối với bệnh nhân suy gan:** Liều nên dùng là 25 mg vì độ thanh thải của sildenafil bị giảm ở những bệnh nhân này. **Đối với bệnh nhân đang dùng phải dùng các thuốc khác:** Bệnh nhân đang dùng ritonavir thì không nên vượt quá một liều đơn tối đa là 25 mg sildenafil trong vòng 48 giờ. Bệnh nhân đang dùng các thuốc có tác dụng ức chế CYP3A4 (ví dụ erythromycin, saquinavir, ketoconazol, itraconazol) thì nên dùng liều khởi đầu là 25 mg. **Đối với người già:** Không cần phải điều chỉnh liều.

- Trong trường hợp quá liều, yêu cầu phải có các biện pháp hỗ trợ phù hợp.

- **CHÔNG CHỈ ĐỊNH:** Cho những bệnh nhân dị ứng với bất kì thành phần nào của thuốc. Sildenafil làm tăng tác dụng hạ huyết áp của các nitrát cấp và mạn tính. Vì vậy chống chỉ định dùng sildenafil cho những bệnh nhân đang dùng những chất cung cấp nitric oxid, các nitrát hữu cơ hay những nitrit hữu cơ dưới bất kỳ hình thức nào dù là thường xuyên hay ngắt quãng.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG

- Phải khai thác tiền sử và khám lâm sàng tỉ mỉ để chẩn đoán rối loạn cương dương, để xác định những nguyên nhân tiềm ẩn và xác định hướng điều trị thích hợp. Vì có thể có một số nguy cơ tim mạch liên quan tới hoạt động tình dục, nên thầy thuốc phải chú ý tới tình trạng tim mạch của bệnh nhân trước khi tiến hành điều trị rối loạn cương dương.
- Không nên dùng các thuốc điều trị rối loạn cương dương ở nam giới được khuyến không nên hoạt động tình dục.