

25/3/16
AJ

Bisolvon®

Bromhexine hydrochloride 8 mg
Breaks down mucus and
Helps clear the chest



30 Tablets

Bisolvon®

Bromhexine hydrochloride 8 mg
Breaks down mucus and
Helps clear the chest



30 Tablets

Bisolvon®

Bromhexine hydrochloride 8 mg
Breaks down mucus and
Helps clear the chest



30 Tablets

Bisolvon®

Bromhexine hydrochloride 8 mg
Breaks down mucus and
Helps clear the chest



30 Tablets

Bisolvon®

Bromhexine hydrochloride 8 mg
Breaks down mucus and
Helps clear the chest



30 Tablets

Bisolvon®

Bromhexine hydrochloride 8 mg
Breaks down mucus and
Helps clear the chest



30 Tablets

Bisolvon®

Bromhexine hydrochloride 8 mg
Breaks down mucus and
Helps clear the chest



30 Tablets

Bisolvon®

Bromhexine hydrochloride 8 mg
Breaks down mucus and
Helps clear the chest



30 Tablets

Bisolvon® Kids

Bromhexine HCL
Thuốc ho long đờm cho trẻ em
Xi rô - Chai 60 ml
KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG
KHÔNG CHỨA CỒN



30 Tablets

Bisolvon® Kids

Bromhexine HCL
Thuốc ho long đờm cho trẻ em
Xi rô - Chai 60 ml
KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG
KHÔNG CHỨA CỒN



30 Tablets

Bisolvon® Kids

Bromhexine HCL
Thuốc ho long đờm cho trẻ em
Xi rô - Chai 60 ml
KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG
KHÔNG CHỨA CỒN



30 Tablets

Bisolvon® Kids

Bromhexine HCL
Thuốc ho long đờm cho trẻ em
Xi rô - Chai 60 ml
KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG
KHÔNG CHỨA CỒN



30 Tablets



Bisolvon® Kids

Bromhexine HCL
Thuốc ho long đờm cho trẻ em
Xi rô - Chai 60 ml
KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG
KHÔNG CHỨA CỒN



30 Tablets

Bisolvon® Kids

Bromhexine HCL
Thuốc ho long đờm cho trẻ em
Xi rô - Chai 60 ml
KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG
KHÔNG CHỨA CỒN



30 Tablets

Bisolvon® Kids

Bromhexine HCL
Thuốc ho long đờm cho trẻ em
Xi rô - Chai 60 ml
KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG
KHÔNG CHỨA CỒN



30 Tablets

Bisolvon® Kids

Bromhexine HCL
Thuốc ho long đờm cho trẻ em
Xi rô - Chai 60 ml
KHÔNG CHỨA ĐƯỜNG
KHÔNG CHỨA CỒN



30 Tablets

Hoạt chất: Bisolvon: 8mg bromhexine HCL/viên; **Bisolvon kids:** 4mg bromhexine HCL/5ml si rô. **Chỉ định:** làm loãng đờm trong các bệnh phế quản phổi cấp và mạn tính có kèm theo sự tiết chất nhầy bất thường và sự vận chuyển chất nhầy suy yếu. **Liều lượng & Cách dùng: Chung cho 2 thuốc:** Trong chỉ định cho bệnh hô hấp cấp tính, hỏi ý kiến bác sĩ nếu triệu chứng không cải thiện hoặc xấu đi trong thời gian điều trị. **Bisolvon:** Người lớn & trẻ > 12 tuổi; 1 viên x 3 lần/ngày; Trẻ 6-12 tuổi: ½ viên x 3 lần/ngày; Trẻ nhỏ 2-6 tuổi: ¼ viên x 2 lần/ngày. Không dùng Bisolvon viên nén cho trẻ < 2 tuổi. Có thể tăng tổng liều đến 48mg/ngày ở người lớn khi bắt đầu điều trị. **Bisolvon Kids:** Người lớn và trẻ > 12 tuổi: 10ml x 3 lần/ngày; Trẻ 6-12 tuổi: 5ml x 3 lần/ngày; Trẻ 2-6 tuổi: 2,5ml x 3 lần/ngày. Có thể tăng tổng liều đến 48mg/ngày ở người lớn và trẻ > 12 tuổi khi bắt đầu điều trị. Thời gian điều trị Bisolvon si rô không quá 8-10 ngày mà không hỏi ý kiến bác sĩ. **Thận trọng: Chung cho 2 thuốc:** Rất ít báo cáo tổn thương da nghiêm trọng như hội chứng Stevens Johnson và hoại tử biểu bì nặng nề. Nên đi khám bác sĩ ngay và ngừng thuốc nếu xuất hiện tổn thương mới ở da và niêm mạc. **Bisolvon:** chứa 222mg lactose cho tổng liều tối đa/ngày. Không dùng cho bệnh nhân bất dung nạp với galactose. **Bisolvon Kids:** chứa 17, 142 sorbitol lỏng cho tổng liều tối đa/ngày. Không dùng cho bệnh nhân bất dung nạp với fructose. Có thể nhuận tràng nhẹ. Nên thận trọng khi sử dụng đồng thời Bisolvon và các thuốc ức chế ho để tránh tích tụ các chất tiết. Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân loét dạ dày và hen, những bệnh nhân là người cao tuổi, suy nhược hoặc quá yếu mà không có khả năng khạc đờm. Hết thận trọng khi sử dụng đồng thời Bisolvon và các thuốc ức chế ho để tránh tích tụ các chất tiết. Sử dụng thận trọng ở những bệnh nhân suy thận hoặc suy gan nặng. **Chống chỉ định:** Bệnh nhân quá mẫn với bromhexine hoặc các thành phần khác của thuốc; bệnh di truyền hiếm gặp có thể không dung nạp với một tá dược của thuốc. **Có thể & cho con bú:** Không nên dùng Bisolvon trong thời kỳ mang thai và thời gian cho con bú. **Khả năng sinh sản:** Chưa tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của Bisolvon đến khả năng sinh sản ở người. Dựa trên kinh nghiệm tiền lâm sàng, không có dấu hiệu cho thấy bromhexine có thể tác động đến khả năng sinh sản. **Ảnh hưởng đến khả năng lái xe & vận hành máy móc:** Chưa nghiên cứu. **Nhà nhập khẩu:** Virmedimex Bình Dương. Địa chỉ: 18 L1-2 VSP II, Đường số 3, Khu Công Nghiệp Việt Nam - Singapore 2, P. Hòa Phú, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3815 062 - Fax: (0650) 3815 063. **Nhà sản xuất:** PT. Boehringer Ingelheim Indonesia, Jl.Lawang Gintung No.89, Bogor, Indonesia. **Độc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Mọi thông tin sản phẩm xin liên hệ:** Lầu 14 - Kumho Asiana Plaza 39 Lê Duẩn - Quận 1 - Tp. HCM. Tel: (08) 3823 6919 - Fax: (08) 387 9916.