

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Enat 400	VN-15978-12

Đơn đề nghị số: 060917/MEGA-QC

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: **VPDD Mega Lifesciences Public Company Limited tại thành phố Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Phòng 5.12A, tầng 5, số 364, đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, pano, áp phích, bảng biển, poster, internet, phương tiện giao thông cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0291/2017/XNQCLD

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

Phương tiện quảng cáo:

Trên báo, tạp chí, tờ rơi, cẩm nang, bảng quảng cáo, bảng đèn, áp phích, băng rôn, internet, trên phương tiện giao thông.




[Handwritten signature]



ENAT 400

Vitamin E 400 IU



Thành phần: Mỗi viên nang gelatin mềm chứa: Vitamin E (dạng d- α -tocopheryl acetate) 400 IU. **Chỉ định:** Điều trị và dự phòng tình trạng thiếu Vitamin E. **Liều lượng:** Điều trị và dự phòng thiếu Vitamin E: 1 viên Vitamin E 400 IU, 1 lần mỗi ngày sau bữa ăn hoặc theo ý kiến bác sĩ. **Chống chỉ định:** Giảm prothrombin do thiếu hụt Vitamin K. **Thận trọng/Cảnh báo:** Việc bổ sung liều cao Vitamin E nên được ngưng khoảng 1 tháng trước khi phẫu thuật và có thể tiếp tục khi đã phục hồi lại sức khỏe sau cuộc phẫu thuật. **Phụ nữ mang thai và đang cho con bú:** - Thời kỳ mang thai: trong thời kỳ mang thai, thiếu hoặc thừa Vitamin E đều không gây biến chứng cho mẹ hoặc thai nhi. Ở người mẹ được dinh dưỡng tốt, lượng Vitamin E có trong thức ăn là đủ và không cần bổ sung. Nếu chế độ ăn kém, nên bổ sung cho đủ nhu cầu hàng ngày khi có thai. - Thời kỳ cho con bú: Vitamin E vào sữa. Sữa người có lượng Vitamin E gấp 5 lần sữa bò và có hiệu quả hơn trong việc duy trì đủ lượng vitamin E trong huyết thanh cho trẻ đến 1 năm tuổi. Nhu cầu vitamin E hàng ngày trong khi cho con bú là 12 mg. Chỉ cần bổ sung cho mẹ khi thực đơn không cung cấp đủ lượng Vitamin E cần cho nhu cầu hàng ngày. **Tác dụng phụ:** Vitamin E không gây tác dụng phụ nào khi dùng ở liều thông thường. Tuy nhiên khi dùng Vitamin E ở liều cao có thể gây buồn nôn, khó chịu ở dạ dày hoặc tiêu chảy, nứt lưỡi, viêm thanh quản hoặc lão hóa da chóng mặt. Những dấu hiệu này thường hiếm gặp nhưng khi có các tác dụng phụ thì chủ yếu là những dấu hiệu về tiêu hóa. Khi xuất hiện các dấu hiệu nêu trên nên tham khảo ý kiến Bác sĩ. **Lưu ý:** Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nhà sản xuất: **MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED** 384 Pattana 3 Road, Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn, 10280 Thái Lan. Liên hệ: Văn phòng đại diện **MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED** tại Việt Nam HCM: 364 Cộng Hòa, Tòa nhà E-Town, Q.Tân Bình. **ĐT: (08) 38123 166 - Hà Nội: (04) 3664 3957. Email: cuscare@megawecare.com. Website: www.megawecare.com.vn. Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế:XNQC....., ngày tháng năm Ngày in tài liệu: Visa: VN-15978-12**