

GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:


STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Kremil Gel	VD-25066-16

Đơn đề nghị số: 369/UIP-2017


Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty TNHH United International Pharma

Địa chỉ: Số 16 VSIP II, đường số 7, KCN Việt Nam - Singapore II, khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Phương tiện quảng cáo: Trên báo, tạp chí, tờ rơi, bảng biển, pano, áp phích, phương tiện quảng cáo ngoài trời cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0302/2017/XNQ/QLD 

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG 



Nguyễn Tất Đạt






Gói gel 20 mL

Kremil®
Gel

LÀM DIU CÁC TRIỆU CHỨNG
ĐAU DẠ DÀY



**Nhà anh chóng
làm diu
cơn đau dạ dày**



THÀNH PHẦN: Mỗi gói (20mL) chứa: Nhôm hydroxyd 356 mg, Magnesi hydroxyd 466 mg, Simethicon 20 mg. **CHỈ ĐỊNH:** Làm diu các triệu chứng tăng tiết acid dạ dày do loét dạ dày tá tràng, viêm dạ dày, viêm thực quản, kèm theo triệu chứng đầy hơi, chướng bụng và các triệu chứng khác do ứ hơi trong đường tiêu hóa. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG:** Thuốc dùng đường uống.

Liều dùng cho người lớn: 1 gói sau khi ăn và 1 gói trước khi đi ngủ; hoặc khi đau, với tổng liều không quá 4 gói mỗi ngày; hoặc theo sự kê toa của bác sĩ. Lắc kỹ gói thuốc trước khi dùng. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Suy thận. Giảm phosphate huyết thanh, nhuyễn xương. Tắc ruột, hẹp vị môn. **THẬN TRỌNG:** Cần dùng thận trọng với người có suy tim sung huyết, phù, xơ gan và chế độ ăn ít natri và với người mới bị chảy máu đường tiêu hóa. Người cao tuổi, do bệnh tật hoặc do điều trị thuốc, có thể bị táo bón và phân rắn. Khi cần dùng thuốc lâu dài, hãy hỏi ý kiến bác sĩ. **ĐỐI VỚI PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:** Thuốc được coi là an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú nhưng nên tránh dùng liều cao kéo dài. Ảnh hưởng lên khả năng kháng acid có chứa magnesi và nhôm. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.** Sản xuất tại **CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA** Số 16 VSIP II, Đường số 7, Khu Công Nghiệp Việt Nam – Singapore II, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. ĐT: 028-39621000.

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Cục quản lý Dược:...../XNQC....., ngày.... tháng.... năm....
Ngày in tài liệu: Ngày....tháng....năm....

Tỷ lệ so với kích thước thật đối với pano, áp phích, băng, biển, phương tiện quảng cáo ngoài trời là: 1:1; 1:2; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25

