

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:


STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Coldi - B	VD-24676-16

Đơn đề nghị số: 154/CV-DNH

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà

Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, Tp. Nam Định, tỉnh Nam Định

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0344/2017/XNQC/QLD-

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



Sổ Mũi, Ngạt Mũi Có COLDi-B

Thuốc Xịt Mũi
COLDi-B



0600206147 - GTC-P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
ĐẠI LÍ NAM HÀ
NHÀ SẢN XUẤT:
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
Địa chỉ: 415 Hàn Thuyên - Nam Định
Website: www.namhapharma.com
Số điện thoại liên hệ: 1800 1155

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y Tế: /XNQC..... ngày.....tháng.....năm.....;



Thuốc Xịt Mũi

COLDi-B

Coldi-B sử dụng đầu xịt phân liều có chứa Oxymetazolin có tác dụng co mạch, chống phù nề do đó hết ngạt tắc mũi, người bệnh dễ thở, cảm thấy dễ chịu ngay. Menthol (bạc hà) có tác dụng giảm đau, chống viêm, Cam phor (long não) có tác dụng sát trùng, gây tê

Thành phần

Oxymetazolin hydroclorid, Camphor, Menthol, Tã được vđ 15ml

Chỉ định

Các chứng ngạt mũi, sổ mũi trong bệnh viêm mũi, viêm xoang, viêm mũi họng, sổ mũi mùa, cảm cúm

Liều dùng

Trẻ em 6 tuổi trở lên và người lớn, 2 lần/ ngày vào buổi sáng và tối

Cách dùng

Cắm lọ thuốc theo phương thẳng đứng xịt thủ vào không khí cho tới khi được làn sương đồng đều. Đặt lọ hướng thẳng vào mũi xịt dứt khoát, đồng thời hít nhẹ để thuốc đi sâu vào trong khoang mũi

Chống chỉ định

Người mẫn cảm với thành phần của thuốc, người bị Glaucom, trẻ em dưới 6 tuổi.
Thuốc không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú

Thận trọng

Dùng Oxymetazolin hydroclorid quá liều, kéo dài hoặc quá thường xuyên có thể kích ứng niêm mạc mũi, đặc biệt ở trẻ em; có thể gây tác dụng phụ toàn thân như tăng huyết áp, hồi hộp lo lắng, buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, đánh trống ngực hoặc nhịp tim chậm phân xạ. Thận trọng với những người bị bệnh mạch vành, đau thắt ngực hoặc tăng huyết áp (bệnh có thể tăng lên do thuốc gây tác dụng trên tim mạch), người dài thảo dương, cường tuyến giáp. Không nên dùng thuốc quá 1 tuần vì dùng thuốc dài ngày có thể gây viêm mũi. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc



Tỷ lệ kích thuốc thực tế: 1 : 1 Phương tiện quảng cáo: sách báo, tạp chí, tờ rơi