

**GIẤY XÁC NHẬN
NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên Cơ quan xác nhận: **Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế**

Xác nhận nội dung quảng cáo thuốc:

STT	Tên thuốc	Số giấy đăng ký lưu hành
1	Air-X 120	VN-19126-15
2		

Đơn đề nghị số: 06.09/17 CV-UC

Tên cơ sở đề nghị xác nhận: Công ty TNHH TM dược phẩm Úc Châu

Địa chỉ: 74/18 Trương Quốc Dung, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM

Phương tiện quảng cáo: Trên báo điện tử, trang thông tin điện tử cho công chúng

Số giấy xác nhận: 0374/2017/XNQC/QLD

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

Viên nén nhai

air-x120

Hương vị bạc hà



Simethicone 120 mg

Nhai **air-x120**

Giảm chướng bụng, đầy hơi sau ăn



Sản xuất tại:

R.X. Manufacturing Co.,Ltd.

76 Moo 10, Salaya-Bangpasi Road, Narapirom,
Banglane, Nakornpathom 73130, Thái Lan.



AUSTROPHARMAVN

Phân phối bởi:

CÔNG TY TNHH TM DƯỢC PHẨM ÚC CHÂU

74/18 Trương Quốc Dung, P. 10, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
ĐT: (028) 38 447 829 Fax: (028) 38 454 175

Số Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Bộ Y tế : 263/2017/XNQC-QLD, ngày 31 tháng 08 năm 2017

Trang 01

24/11/17 MS

Viên nén nhai

air-x120
Hương vị bạc hà



Simethicone 120 mg

Visa No: VN-19126-15

Viên nén nhai, chữa đầy hơi và chướng bụng.

Các rối loạn tiêu hóa có xu hướng liên quan đến sự tích tụ quá nhiều hơi ở dạ dày ruột.

Các triệu chứng thông thường nhất là cảm giác bị đè ép, căng và đầy thượng vị, ợ hơi, trung tiện.

Air-X 120 giúp điều trị sự ứ hơi bất thường trong ống tiêu hóa.

Simethicone làm giảm sức căng bề mặt của các bóng hơi trong niêm mạc ống tiêu hóa, làm xẹp các bóng khí này, trợ giúp cho sự tổng hợp của ống tiêu hóa làm giảm chướng bụng. Simethicone là một chất không có độc tính, trợ về mặt hóa học và được dung nạp tốt vì vậy tiện dụng cho điều trị, ngăn ngừa những cảm giác khó chịu vì ứ hơi trong đường tiêu hóa và chướng bụng. Simethicone còn có tác dụng làm ngắn đi thời gian di chuyển của hơi dọc theo ống tiêu hóa.

Thành phần: Mỗi viên nén nhai chứa 120 mg hoạt chất Simethicone.

Chỉ định:

Đầy hơi ở đường tiêu hóa, cảm giác bị đè ép và căng ở vùng thượng vị, chướng bụng thoáng qua thường có sau bữa ăn thịnh soạn hoặc ăn nhiều chất ngọt, chướng bụng sau phẫu thuật; chuẩn bị chụp X-quang (dạ dày, ruột, túi mật, thận) và trước khi nội soi dạ dày.

Liều dùng:

Liều dùng thông thường là nhai kỹ 1 viên sau bữa ăn và trước khi đi ngủ, 3 - 4 lần/ngày.

Trong trường hợp chuẩn bị chụp X-quang thì dùng 2 hoặc 3 ngày trước khi chụp. Liều dùng được điều chỉnh tùy theo tuổi và triệu chứng của bệnh nhân.

- Sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi - 12 tuổi: 120 mg Simethicone/ngày, uống sau bữa ăn, chia làm 4 lần nên dùng dạng giọt. Nếu dùng dạng viên, dùng 1 viên 1 ngày.

- Trẻ em dưới 2 tuổi không dùng dạng viên này.

Chống chỉ định: Trường hợp quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Thận trọng: Không được dùng quá 4 viên/ngày trừ khi có chỉ định và theo dõi của bác sĩ.

Quá liều:

Chưa có báo cáo nào về tác dụng gây hại của thuốc khi sử dụng quá liều có lẽ là do tính chất trợ về mặt hóa học và không được hấp thu qua đường tiêu hóa của Simethicone.

Tuy nhiên nếu có triệu chứng bất thường khi dùng thuốc quá liều hãy đến bệnh viện để được áp dụng các biện pháp giải độc thông thường và điều trị theo triệu chứng.

Tác dụng phụ:

Air-X 120 làm giảm đáng kể triệu chứng và loại bỏ khí gây chứng đầy hơi. Thành phần hoạt tính quan trọng nhất của Air-X 120 là Simethicone, không được hấp thu vào dạ dày và ruột, do đó thường không có bất kỳ tác động gây hại nào cho cơ thể.

Cần thông báo cho bác sĩ các tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Tương tác thuốc:

Chưa có tương tác thuốc nào giữa Air-X 120 với thuốc khác được báo cáo.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe hay vận hành máy móc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thuốc có thể dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Tuy nhiên không rõ thuốc có qua được nhau thai vào thai nhi hay bài tiết vào sữa mẹ hay không. Do đó cần thận trọng khi sử dụng thuốc.

Sử dụng cho người già, người suy gan, suy thận:

Do Simethicone không hấp thu vào máu qua đường tiêu hóa nên không gây ảnh hưởng gì đối với người già, người suy gan, suy thận.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng