

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 101 /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic

Địa chỉ: 367 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08. 39200300

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Rectiofar	VD-19338-13

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi, pano, phương tiện giao thông cho công chúng

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 01 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty Cổ phần Dược phẩm dược liệu Pharmedic có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



Pectiofar

thuốc trị táo bón

Handwritten signature and date:
26/04/2018



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIU PHARMEDIC

367 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp. HCM | Tel: (84) 08 39 200 300 | Fax: (84) 08 39 200 096 | Website: www.pharmedic.com.vn

CÔNG THỨC:
- Glycerin: 59,53g.
- Nước tinh khiết: vừa đủ 100ml.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG:
- Bơm thuốc vào trực tràng, ngày 2 ống, 1-2 lần/ ngày.

CHỖNG CHỈ ĐỊNH:
- Dùng với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Trị trong đợt cấp, do hậu môn, tiêu chảy.

LƯU Ý - THẬN TRỌNG:
- Người bị bệnh tim, thận hay gan.
- Người cao tuổi.
- Người bệnh ở tình trạng tinh thần lú lẫn, suy tim sung huyết, lão suy ở người cao tuổi, đại tháo đường và mất nước trầm trọng.

PHỤ NỮ MANG THAI VÀ PHỤ NỮ CHO CON BÚ:
- Glycerin có thể sử dụng trong quá trình mang thai nếu thật sự cần thiết.
- Thuốc nên dùng thận trọng đối với phụ nữ cho con bú.

TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LẠI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
- Glycerin có thể gây kích ứng tại chỗ khi dùng đường trực tràng.
- Sau khi dùng đường trực tràng thuốc ít được hấp thu, nhưng khi hấp thu:
Thuốc có thể gây đau đầu, nôn, ỉa gặp trường hợp choáng váng, lú lẫn, tiêu chảy, buồn nôn, khát.
Một số triệu chứng nhiễm xảy ra: loạn nhịp tim, tăng đường huyết.
Thông báo cho Bác Sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUẢ LIỀU VÀ XỬ TRÍ:
- Quả liều có thể gây tiêu chảy nặng, nôn, loạn nhịp tim, kích ứng trực tràng, đau rất trực tràng và co rút, tăng đường huyết.
- Trường hợp quá liều mạnh phải ngừng thuốc và đưa người bệnh vào bệnh viện.

DƯỢC LỰC HỌC:
- Glycerin được dùng qua đường trực tràng để hút dịch vào đại tràng và do đó thúc đẩy thải phân khi táo bón. Thuốc còn có tác dụng gây trơn và làm mềm phân.

DƯỢC ĐỘNG HỌC:
- Khi dùng đường trực tràng, sự hấp thu của thuốc kém.

CHỈ DÙNG NGOÀI, KHÔNG ĐƯỢC UỐNG.
BÉ XÁ TÂM TÀI TRÉ EM,
ĐƯỢC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, THUỐC KHI DÙNG,
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ.

Số giấy xác nhận HSDKQOC của cục QLD BHYT: .../.../ XNQC - QLD