

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **104**/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày **28**.. tháng **07**.. năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Địa chỉ: Số 27, Đường 3A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613 892 353

Fax: 0613 892 344

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Star sore throat	VD-14755-11

Phương tiện quảng cáo: Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Tất Đạt

Viên ngậm

STAR
SORE THROAT



Pharmaceuticals



**GIẢM NHANH
ĐAU HỌNG**

Số giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo thuốc của Cục Quản lý Dược: xxx/xxxx/XNQC-QLD ngày ... tháng ... năm ... Ngày ... tháng ... năm ... in tài liệu. Tài liệu thông tin thuốc gồm 02 trang (Chi tiết xem trang 02)



Viên ngậm

STAR
SORE THROAT



Pharmaceuticals



GIẢM NHANH ĐAU HỌNG

THÀNH PHẦN: Mỗi viên chứa:

- Tyrothricin: 4 mg
- Cetrimonium bromid: 2 mg
- Lidocain: 1 mg

CHỈ ĐỊNH: Khử khuẩn tại chỗ và giảm đau trong nhiễm khuẩn vùng miệng họng như đau họng, viêm miệng, viêm họng, viêm thanh quản, viêm nướu răng, viêm nha chu, điều trị trước và sau phẫu thuật trong những phẫu thuật ở vùng miệng họng như cắt amidan, phẫu thuật hàm mặt, phẫu thuật răng.

CÁCH DÙNG - LIỀU DÙNG: Nhiễm khuẩn cấp tính nặng: Ngậm tan dần một viên mỗi 1-2 giờ hoặc tùy chỉ định bác sĩ. Nhiễm trùng nhẹ - trung bình: Ngậm tan dần một viên mỗi 2 - 3 giờ hoặc tùy chỉ định bác sĩ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

LƯU Ý VÀ THẬN TRỌNG: Chưa có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Hiếm gặp các tác dụng phụ như buồn nôn, nôn, hạ huyết áp, chóng mặt, loạn nhịp tim, nhìn mờ, kích động, khó thở, co giật, ngứa, phát ban, phù. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

TƯƠNG TÁC THUỐC: Tyrothricin và Cetrimonium bromid: Chưa có báo cáo. Lidocain: Lidocain nên dùng thận trọng ở bệnh nhân đang dùng các thuốc tê dẫn chất amid có tác dụng chống loạn nhịp (như mexiletin), vì làm tăng tác dụng độc hại. Khi dùng đồng thời lidocain với thuốc chẹn beta hoặc cimetidin, sự chuyển hóa lidocain có thể bị giảm hoặc bị ức chế.

QUÁ LIỀU VÀ XỬ TRÍ: Nên theo dõi chặt chẽ, điều trị hỗ trợ và triệu chứng.

TRÌNH BÀY: Hộp 2 vỉ x 8 viên.

BẢO QUẢN: Ở nhiệt độ từ 15°C đến 25°C, tránh ánh sáng và ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc khi quá hạn sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng - Để xa tầm tay trẻ em không dùng quá liều chỉ định - Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.

NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPV - Số 27, Đường 3A, KCN Biên Hoà II, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Handwritten signature