

**BỘ Y TẾ  
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----

Số: *120* /2017/XNQ-QLD

Hà Nội, ngày *15* tháng *05* năm 2017

### **GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC**

Tên tổ chức, cá nhân: **Văn phòng đại diện GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: **Phòng 701, lầu 7, Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **08 3827 5929**

Fax: **08 3827 5927**

| STT | Tên thuốc                   | Số đăng ký thuốc |
|-----|-----------------------------|------------------|
| 1   | Panadol Extra with Optizorb | VN-19964-16      |

**Phương tiện quảng cáo:** Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi, bảng, biển, áp phích, decal, màn hình chuyên quảng cáo, báo điện tử và các trang thông tin điện tử cho công chúng.

**Nội dung quảng cáo:** Theo nội dung gồm 01 trang (mã code: CHPAN/0039/16c) có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Văn phòng đại diện GlaxoSmithKline Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Nguyễn Tất Đạt**



**GIỚI THIỆU PANADOL EXTRA WITH OPTIZORB**

- ✓ Đau đầu & Đau nửa đầu
- ✓ Đau răng
- ✓ Đau cơ <sup>(4)</sup>

(\*) Các triệu chứng ở mức độ từ nhẹ đến vừa



**Thành phần:** Mỗi viên nén bao phim chứa 500 mg paracetamol và 65 mg caffeine. **Chỉ định:** Panadol Extra với Optizorb chứa paracetamol là một chất hạ sốt, giảm đau và caffeine là một chất tăng cường tác dụng giảm đau của paracetamol. Panadol Extra with Optizorb có hiệu quả trong: Điều trị đau nhẹ đến vừa và hạ sốt bao gồm: Đau đầu, đau nửa đầu, đau cơ, đau bụng kinh, đau họng, đau cơ xương khớp và đau sau khi tiêm vắc xin, đau sau khi nhổ răng hoặc sau các thủ thuật nha khoa, đau răng, đau do viêm xương khớp. **Liều lượng và cách dùng:** Người lớn (kể cả người cao tuổi) và trẻ em từ 12 tuổi trở lên: Chỉ dùng đường uống. Nên dùng 500 mg paracetamol / 65 mg caffeine đến 1000 mg paracetamol / 130 mg caffeine (1 hoặc 2 viên) mỗi 4 đến 6 giờ nếu cần. Liều tối đa hàng ngày: 4000 mg / 520 mg (paracetamol / caffeine). Không dùng quá liều chỉ định. Nên sử dụng liều thấp nhất cần thiết để có hiệu quả điều trị. Thời gian tối thiểu dùng liều lặp lại: 4 giờ. Trẻ em dưới 12 tuổi: không khuyến nghị dùng thuốc này cho trẻ em dưới 12 tuổi. **Chống chỉ định:** Chống chỉ định cho những bệnh nhân có tiền sử quá mẫn với paracetamol, caffeine hoặc với bất kỳ tá dược nào của thuốc. **Thận trọng và lưu ý đặc biệt:** Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Chứa paracetamol. Không dùng với các thuốc khác có chứa paracetamol. Sử dụng đồng thời các thuốc khác có chứa paracetamol có thể dẫn đến tình trạng quá liều. Dùng quá liều paracetamol có thể gây ra suy gan, điều này có thể dẫn đến việc ghép gan hay tử vong. Tiền các bệnh nhân đang bị các bệnh về gan, có sự gia tăng nguy cơ gây hại của paracetamol đối với gan. Tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng thuốc này cho các bệnh nhân được chẩn đoán là suy gan hoặc suy thận. Đã có báo cáo trường hợp rối loạn/suy giảm chức năng gan ở những bệnh nhân bị thiếu hụt glutathione như suy dinh dưỡng, biếng ăn trầm trọng, có chỉ số khối cơ thể thấp hoặc người nghiện rượu mạn tính. Những bệnh nhân ở trạng thái thiếu hụt glutathione như nhiễm trùng máu, sử dụng paracetamol có thể làm tăng nguy cơ chuyển hóa acid trong máu. Nếu các triệu chứng cơn dai dẳng, tham khảo ý kiến bác sĩ. Tránh dùng quá nhiều caffeine (ví dụ như từ cà phê, trà và một số đồ uống đóng hộp khác) trong khi đang dùng thuốc này. Để xa tầm tay trẻ em. **Phụ nữ mang thai và cho con bú: Khẩn trương sinh sản:** Chưa có dữ liệu. **Phụ nữ mang thai:** Paracetamol đã được phân loại vào nhóm B về động vật vẫn chưa xác định được bất kỳ nguy cơ nào của paracetamol-caffeine trong thai kỳ. Tuy nhiên, nó phải tiến hành theo khuyến nghị dùng paracetamol-caffeine trong thai kỳ chỉ khi lợi ích dự kiến của thuốc vượt trội hơn so với nguy cơ tiềm ẩn của thuốc. Paracetamol-caffeine nên tránh dùng lâu dài ngay cả với liều thường lệ liên quan tới việc tích lũy caffeine trong sữa mẹ. Paracetamol-caffeine cũng không được bài tiết vào sữa mẹ. Paracetamol/ Caffeine không được khuyến khích dùng nếu không cần thiết vì không xác định được bất cứ nguy cơ nào đối với người mẹ đang cho con bú. Paracetamol và caffeine trong sữa mẹ có thể có tác dụng kích thích đơn giản nhưng không đáng kể. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** Sản xuất tại Công ty Cổ phần Dược Dungarvan Ltd. Knockdrack, Dungarvan, Co. Waterford Ireland. Đông y học Việt Nam - Công ty Cổ phần Dược (M) Sdn Bhd. Lot. 89, Jalan Enggang, Ampang/Ulu Kelang Industrial Estate - 68000 Ampang, Selangor Malaysia. **Nhà nhập khẩu:** Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương – Số 18 E-2/ĐP 4 Đường số 3, Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore 2, Phường Hòa Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương.  
Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Cục Quản lý Dược: x/xxxx/VNOC-QID, ngày ..... năm.....

PANADOL là nhãn hiệu sở hữu bởi hoặc cấp phép cho Tập đoàn GSK.

Kích thước tối thiểu: 1.1 với các hình thức in sách báo, tạp chí, tờ rơi, vật phẩm in ấn; không kể trên báo điện tử & các trang thông tin điện tử dành cho công chúng. 1.2 với hình thức bảng biển, áp phích, poster, decal (dán ở mặt trước quầy thuốc hoặc trong khu vực trưng bày của nhà thuốc) và màn hình chuyển quảng cáo (không đặt ngoài trời, không có âm thanh) dành cho công chúng.

CHVN/CHPAN/0039/16c