

Số: 142/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 201...

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam

Địa chỉ: 123 Nguyễn Khoái, Q.4, TP. HCM

Điện thoại: 84 8 38298526

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Nautamine	VD-19726-13

Phương tiện quảng cáo: Trên phương tiện giao thông, banner cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 1 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt

25/5/17
H3



★ Chỉ cần uống trước khi khởi hành 30 phút.

DANG TRINH BAY: Viên dễ bể, hộp 20 vỉ, vỉ 4 viên. **THÀNH PHẦN:** Diacefylline diphenhydramine 90 mg, tá được vừa đủ 1 viên. **CHỈ ĐỊNH:** Nautamine là một thuốc kháng histamine: diphenhydramine. Nautamine được chỉ định dùng cho người lớn và trẻ em trên 2 tuổi để phòng ngứa và điều trị say tàu xe. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Trẻ em dưới 2 tuổi, do đang thuốc không thích hợp; Bệnh tăng nhãn áp (glaucoma); Triệu khó do bệnh lý tuyến tiền liệt hoặc nguyên nhân khác; Dùng với thuốc kháng histamine. Nói chung không nên dùng Nautamine trong thời kỳ đang cho con bú hoặc đang điều trị với enoxacin, ngoại trừ khi có chỉ định của Bác sĩ. **LƯU LƯỢNG:** Người lớn hoặc trẻ em trên 12 tuổi: 1 – 1,5 viên/lần, không quá 6 viên/ngày. Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi: 1 viên/lần, không quá 4 viên/ngày. Trẻ em từ 2 đến 6 tuổi: Nghiền ½ viên Nautamine hòa với ít nước. Dùng ½ viên mỗi lần, không dùng quá 2 viên/ngày.

CÁCH DÙNG: Uống thuốc nửa giờ trước khi đi tàu xe và lặp lại sau 6 giờ nếu cần. **THẬN TRỌNG:** Bệnh gan — thận lâu ngày cần bảo cho bác sĩ để điều chỉnh liều dùng; Người già chỉ nên dùng thuốc khi có ý kiến của bác sĩ; Thuốc có thể gây táo bón, chóng mặt, ngủ gà, bệnh tuyến tiền liệt; Thuốc có thể gây chóng mắt, đặc biệt khi dùng chung với cồn; không uống rượu hoặc dùng thuốc, thức uống chứa rượ trong thời gian dùng thuốc. **TƯƠNG TÁC THUỐC:** Thuốc có chứa chất kháng histamine: diphenhydramine, không nên dùng kết hợp với các thuốc có chứa chất này để bảo đảm không quá liều tới đa cho phép. **LÚC CÓ THAI — THỜI KỲ ĐANG CHO CON BÚ:** Có thai: có thể dùng thuốc này trong thời gian mang thai, chỉ dùng một vài ngày với liều khuyến cáo; Cuối thai kỳ: việc sử dụng qua mức thuốc này có thể ảnh hưởng cho trẻ sơ sinh; Thời kỳ đang cho con bú: không dùng cho phụ nữ cho con bú. **LÀI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Lưu ý các tài xế vì nguy cơ bị lơ mơ, giảm tỉnh táo khi sử dụng thuốc này. Hiện tượng này tăng thêm khi uống rượu. **TẮC DUNG NGOẠI Y:** Phản ứng dị ứng (phát ban ngoài da, phù Quincke, sốc quá mẫn); Giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu; Lo mơ, giảm tỉnh táo, giảm tập trung, chóng mặt; Điều khiển máy móc kém, run; Lăn lộn, áo giặc; Khô miệng, loạn thị, bi triểu, đánh trống ngực, hạ huyết áp. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

NHÀ SẢN XUẤT: Công ty TNHH Sanofi — Aventis Việt Nam, 123 Nguyễn Khoái, Quận 4, TPHCM. **NHA PHÂN PHỐI:** Công ty TNHH TM Dược Thuận Gia, 781/D7 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TPHCM. **ĐT:** (08) 39 7979 01. **Fax:** (08) 39 7979 00. **THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:** Công ty TNHH Sanofi — Aventis Việt Nam, 123 Nguyễn Khoái, Quận 4, TPHCM. **ĐT:** (08) 39 4006 23. **Fax:** (08) 38 25 43 60. **SAVN.DPHD.17.03.0053.**

SANOVI 