

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *194*/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày *26*.. tháng *05* năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: **Văn phòng đại diện Tedis tại TP. Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: **Phòng 2B Lầu 2 và Lầu 4, Tòa nhà C, 150 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **04 3772 3819**

Fax: **04 3772 3820**

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Pepsane	VN-8939-09

Phương tiện quảng cáo: Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi, bảng, biển, pano, áp phích, trang thông tin điện tử cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 01 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Văn phòng đại diện Tedis tại TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

PEPSANE[®]

Gel uống - Gói



ĐAU DẠ DÀY



TRƯỚNG BỤNG



1 - 2 gói/lần x 2 - 3 lần/ngày

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

THÀNH PHẦN: Guaiazulene 0,004 g, Dimethicone 3 g. Tá dược: Sorbitol 70% (kết tinh), caraghenat, natri cyclamat, methyl parahydroxybenzoat (E218), tinh dầu bạc hà, nước tinh khiết cho một gói 10g.

DẠNG BẢO CHẾ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Gel uống. Hộp 30 gói. **CHỈ ĐỊNH:** Điều trị triệu chứng đau dạ dày. Dùng trong trường hợp trướng bụng. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Đường uống. Uống trực tiếp, 1-2 gói, 2-3 lần/ngày, trước bữa ăn hoặc lúc đau. Pepsane không chứa đường nên không chống chỉ định cho bệnh nhân tiểu đường. Pepsane không cản tia X.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. **LƯU Ý ĐẶC BIỆT:** Do có chứa sorbitol, thuốc này chống chỉ định ở bệnh nhân bị bất dung nạp fructose. **TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC:** Không có. **MANG THAI - CHO CON BÚ:** Thuốc này có thể dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Hiếm khi xảy ra phát ban hay ngứa. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. **CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LÝ:** Gaiazulene có tác dụng chống viêm tại chỗ. Gaiazulene ngăn phóng thích histamine của các đường bào. Dimethicone tạo một lớp phủ niêm mạc tiêu hóa và ngăn sự hình thành bong bóng hơi. Với liều cao hơn nhiều liều điều trị, gaiazulene được tìm thấy ở dạng vết trong máu. **BẢO QUẢN - HẠN DÙNG:** Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản ở nhiệt độ dưới 25°C. Không dùng quá ngày hết hạn dùng ghi trên bao bì. Hạn dùng 24 tháng kể từ ngày sản xuất. **NHÀ SẢN XUẤT:** Laboratoires ROSA - PHYTOPHARMA. Trụ sở chính: 68 rue Jean Jacques Rousseau. 75001 Paris - PHÁP. Nơi sản xuất: 2, avenue du Traité de Rome B.P.51. 78401 Chatou Cedex - PHÁP.



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIỆT HÀ
Số 4 Lũy Á Trường Sơn, P. 15, Q. 10, TP. HCM - Tel: (08) 3970 3695
CH HÀ NỘI
814/013 Khu DTM Cầu Giấy, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, HN - Tel: (04) 3764 3937
CH ĐÀ NẴNG
152 Hồ Quý Ly, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng - Tel: (051) 1374 1168