

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 160/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Tư vấn và Truyền thông BizHub

Địa chỉ: 302 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3991 1919

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Estraceptin	VN-17085-13

Phương tiện quảng cáo: Trên báo điện tử, trang thông tin điện tử và màn hình chuyên quảng cáo cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 03 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty TNHH Tư vấn và Truyền thông BizHub có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



KỊCH BẢN QUẢNG CÁO ESTRACEPTIN GỒM 2 PHẦN CẢNH

Phần cảnh 1: xuất hiện và tự động đứng yên trong 15 giây

Phần cảnh 2: Tự động xuất hiện sau phần cảnh 1 và đứng yên cho đến khi người đọc tắt




05/06/2017



KỊCH BẢN QUẢNG CÁO ESTRACEPTIN GỒM 2 PHẦN CẢNH
Phần cảnh 1: xuất hiện và tự động đúng yên trong 15 giây

Estraceptin®

Tránh thai hiệu quả⁽¹⁾



*Đã dùng
05/06/2012*

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược:
.../2017/XNQC-QLD, ngày ... tháng ... năm 2017

1

Abbott

302-C,
G. TY
ỆM HỒU H,
TRUYỀN THỐ
ZIUB
TP HỒ CH

Estraceptin®

Tránh thai hiệu quả⁽¹⁾



ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. THAM KHẢO Ý KIẾN BÁC SỸ NẾU CẦN. ■ THÀNH PHẦN: 21 viên bao phim màu trắng chứa: Desogestrel 0,150 mg; Ethinyl Estradiol 0,020 mg. 2 viên bao phim màu xanh lục chứa tá dược. 5 viên bao phim màu vàng chứa: Ethinyl Estradiol 0,010 mg. ■ **CHỈ ĐỊNH:** Tránh thai. ■ **LIỀU VÀ CÁCH DÙNG:** Uống viên số 1 (ghi ở mặt sau hộp nhựa) vào ngày đầu tiên của kỳ kinh. Uống mỗi ngày 1 viên theo thứ tự: 21 viên trắng, 2 viên xanh, 5 viên vàng, giữ đúng trình tự theo số và chiều mũi tên cho tới khi hết vi. Khi hết viên cuối cùng của vỉ cũ, chuyển sang uống viên số 1 của vỉ mới vào hôm sau, cho dù chưa thấy kinh hoặc đã ngưng kinh. Cần ghi nhớ ngày uống viên số 1 (ngày 1) và các ngày 8, 15, 22 do luôn rơi vào cùng một ngày trong tuần, điều này giúp dùng thuốc đúng cách. Để tránh quên thuốc, nên uống vào cùng một thời điểm trong ngày. Nếu quên thuốc, uống ngay khi nhớ, không trễ quá 12 giờ sau giờ uống thuốc thường ngày. Nếu trễ quá 12 giờ, khả năng tránh thai không còn bảo đảm, tiếp tục uống những viên còn lại vào thời điểm thường kỳ và sử dụng thêm một biện pháp tránh thai phụ cho đến hết chu kỳ và thử thai trước khi dùng thuốc ở chu kỳ kế tiếp. ■ **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** - Không được dùng trong các bệnh: huyết khối tắc mạch, tiền căn huyết khối tắc mạch; bệnh về mạch máu ở tim, não, hay mắt; suy thận; bệnh ác tính ở vú, tử cung hay tuyến yên phụ thuộc hormon; suy gan nặng hoặc khối phất; xuất huyết đường sinh dục chưa được chẩn đoán, porphyria; bệnh xơ tại; tiểu đường; tăng lipid máu; chứng ứ mật tại phất; tiền sử bệnh herpes khi mang thai; có thai; cho con bú; vàng da trong lúc mang thai không rõ nguyên do. - Chống chỉ định tương đối: rối loạn biến dưỡng, bệnh như béo phì; tăng tiết sữa, với nồng độ prolactin cao; tiền sử sỏi mật chưa điều trị. ■ **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Có thể có các triệu chứng hiếm như tăng huyết áp, vàng da tắc mật, tăng lipid máu, tiểu đường, đau vú nặng, bệnh tuyến vú lành hoặc ác tính, buồn tử cung, buồn gan, tăng tiết sữa, cần được chuẩn đoán bệnh u tuyến yên, buồn nôn, nhức đầu, tăng trọng; căng vú; dễ bị kích thích hoặc trầm cảm; nám da; chảy máu giữa các kỳ kinh; kinh nguyệt ít; nhiễm nấm candida âm đạo; ngứa cơ sởi mặt; có thể xuất hiện chứng không dung nạp nhận kính sắt trong; Hô hấp sẽ nếu có những tác dụng không mong muốn khác chưa được đề cập ở trên. ■ **THẬN TRỌNG KHI DÙNG:** Uống thuốc khi có các triệu chứng: nhức đầu nặng hoặc bất thường, thay đổi thị giác, tăng huyết áp. Lưu ý: Khám sức khỏe định kỳ trước và trong điều trị. Theo dõi đặc biệt ở bệnh nhân đông kinh, nhức nửa đầu, hen, trầm cảm, có tiền sử gia đình về ung thư vú; Trong trường hợp xuất hiện rối loạn tiêu hóa như nôn mửa, có thể làm giảm tác dụng của thuốc. Trong trường hợp có kế hoạch phẫu thuật, ngưng thuốc 1 tháng trước phẫu thuật và không được tiếp tục điều trị trong giai đoạn chưa đi lại được. Ngưng điều trị trong trường hợp phải nằm 1 chỗ lâu dài. ■ **TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC:** Thông tin cho bác sỹ tất cả thuốc bạn đang dùng, kể cả thuốc không kê đơn. Tương tác có thể xảy ra: Dùng chung Troleandomycine làm tăng nguy cơ vàng da ứ mật. Không dùng với các thuốc gây cảm ứng men như: Barbiturat, Phenytoin, Primidone, Carbamazepin, Rifampin, Griseofulvin vì giảm tác dụng tránh thai. ■ **PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:** Phụ nữ có thai: Không dùng. Phụ nữ cho con bú: Không dùng. ■ **NGƯỜI LAI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:** Không có báo cáo. ■ **QUẢ LIỀU VÀ VỮ TRI:** Quả liều có thể gây buồn nôn, xuất huyết. Đến bác sỹ ngay. Nên tiến hành rửa dạ dày, các liệu pháp nâng đỡ và duy trì cần thiết. Triệu chứng quá liều trên trẻ khi uống liều cao Estraceptin chưa được báo cáo. ■ **BẢO QUẢN:** Giữ nơi khô mát, tránh ánh sáng, dưới 30°C và xa tầm với trẻ em. ■ **TRÌNH BÀY:** Hộp 1 vỉ 28 viên bao phim gồm 21 viên trắng, 2 viên xanh lục, 5 viên vàng. ■ **HẠN DÙNG:** 36 tháng từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghi trên nhãn. ■ **TIEU CHUẨN CHẤT LƯỢNG TCCS: NHÀ SẢN XUẤT: LABORATORIOS RECALCINE S.A., Carrascal No. 5670, Santiago, Chile. ■ NPP: Vimedimex Bình Dương, 18 L1-2, đường số 3 VSIP II, P. Hòa Phú, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương. ĐT: 1800-545402. Thông tin về sản phẩm xin gọi 0838242006. Tài liệu tham khảo (1) Hướng dẫn sử dụng thuốc. Chủ sở hữu giấy phép tại Việt Nam: Abbott Laboratories (Singapore) Private Limited - 1 Maritime Square #12-01, Harbourfront Centre Singapore 099253**

MARCOM-004/03/2017

Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược:
..../2017/XNQC-QLD, ngày ... tháng ... năm 2017

2

 Abbott

05/06/2018