

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 174/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: **Văn phòng đại diện Bayer (South East Asia) Pte Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: **Tầng 3, tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **083.602 9139**

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Canesten	VN-15730-12

Phương tiện quảng cáo: Trên tạp chí, tờ rơi cho công chúng

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.


Văn phòng đại diện Bayer (South East Asia) Pte Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**




Nguyễn Tất Đạt

GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO do nấm và vi khuẩn nhạy cảm với Clotrimazole



13/06/2018



Số giấy xác nhận nội dung Quảng Cáo của Cục Quản Lý Dược, ngày ... tháng ... năm 2017
Ngày, tháng, năm in tài liệu / /

Tài liệu gồm 2 trang, thông tin chi tiết sản phẩm xem ở trang 2



GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂM ĐẠO do nấm và vi khuẩn nhạy cảm với Clotrimazole



13/06/2018

Canesten®

Thành phần: Mỗi viên đặt âm đạo chứa: Clotrimazole 500 mg. Hộp có 1 vỉ chứa 1 viên đặt âm đạo, kèm theo dụng cụ đặt thuốc.

Chỉ định: Viêm âm đạo do:

- Nấm (thường là Candida)
- Bội nhiễm bởi các vi khuẩn nhạy cảm với Clotrimazole

Liều dùng và cách sử dụng:

Liều đơn 1 viên đặt âm đạo vào buổi tối. Canesten, viên đặt âm đạo nên đặt vào buổi tối trước khi đi ngủ vào âm đạo càng sâu càng tốt. Tốt nhất nên đặt thuốc ở tư thế nằm ngửa, đầu gối hơi gập. Viên đặt âm đạo Canesten cần có độ ẩm trong âm đạo để phân rã hoàn toàn, nếu không những mảnh thuốc không được hòa tan có thể sẽ bị đẩy ra ngoài âm đạo. Để ngăn ngừa tình trạng này, điều quan trọng là đặt thuốc vào âm đạo càng sâu càng tốt vào lúc đi ngủ. Trường hợp viên thuốc không phân rã hoàn toàn trong một đêm, nên cân nhắc sử dụng dạng kem bôi âm đạo. Nếu các triệu chứng không thuyên giảm sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân cần tham vấn bác sĩ. Điều trị



Canesten có thể lặp lại khi cần thiết, tuy nhiên những trường hợp tái phát có thể đang có một căn nguyên. Bệnh nhân nên đến khám bác sĩ nếu các triệu chứng trở lại trong vòng 2 tháng. Nếu môi âm hộ và các khu vực lân cận cùng bị viêm nhiễm, nên kết hợp đặt thuốc trong âm đạo và điều trị tại chỗ bằng kem bôi ngoài. Bạn tình cũng nên được điều trị tại chỗ nếu có các triệu chứng như là ngứa, viêm,... Không nên điều trị trong khi đang có kinh nguyệt. Việc điều trị nên hoàn tất trước kỳ kinh. Không sử dụng băng vệ sinh, dụng cụ thụ âm đạo, chất diệt tinh trùng hoặc các sản phẩm âm đạo khác khi đang sử dụng Canesten. Tránh giao hợp khi bị viêm âm đạo và khi đang sử dụng Canesten phòng viêm nhiễm có thể lây truyền cho bạn tình.

Viên đặt âm đạo Canesten sử dụng được trong thời gian mang thai nhưng không được dùng dụng cụ đặt thuốc. Thuốc dùng cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Chống chỉ định: Nhạy cảm với Clotrimazole hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Nếu bệnh nhân có sốt (nhiệt độ 38°C hoặc cao hơn), đau bụng dưới, đau lưng, dịch tiết âm đạo có mùi hôi, buồn nôn, xuất huyết âm đạo, và / hoặc liên quan đến đau vai, bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Để thuốc xa tầm tay của trẻ em. Tránh tiếp xúc với mắt.

Không nuốt.

Phụ nữ có thai và cho con bú:

Phụ nữ có thai: Dữ liệu về việc sử dụng Clotrimazole trên phụ nữ có thai hạn chế. Các nghiên cứu trên động vật không cho thấy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến độc tính sinh sản. Như một biện pháp phòng ngừa, tốt nhất là tránh sử dụng Clotrimazole trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Viên đặt âm đạo Canesten sử dụng được trong thời gian mang thai do có thể đặt mà không cần sử dụng dụng cụ đặt thuốc.

Cho con bú: Dữ liệu về dược động học và độc tính trên động vật cho thấy Clotrimazole và chất chuyển hóa bài tiết ra sữa. Nên ngưng cho con bú trong thời gian điều trị với Clotrimazole.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Nhà sản xuất: BAYER PHARMA AG 51368 Leverkusen – Germany

