

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Số: 172/2017/XNQC-QLD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Văn phòng đại diện Bayer (South East Asia) Pte Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Centre Point, số 106 Nguyễn Văn trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083.602 9139

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Canesten	VN-15730-12

Phương tiện quảng cáo: Trên pano, bảng biển cho công chúng

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 01 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Văn phòng đại diện Bayer (South East Asia) Pte Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Tất Đạt



13/05/2018

Canesten®
Clotrimazole



GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ VIÊM AM ĐÀO
do nấm và vi khuẩn
nhảy cảm với Clotrimazole

[illegible]

đạo, chất diệt thực vật hoặc các sản phẩm của một loài khác khi dân sử dụng Cisenetex. Tránh gặp hợp chất bị viêm amidan do và khi dùng thuốc Cisenetex phòng viêm nhiễm có thể lấy thuốc cho bạn thử. Viên đất ẩm độ Cisenetex sẽ được dùng trong thời gian mang thai nhưng không được dùng cùng với đất thuốc. Thông định cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên.

Chống chỉ định: Nhảy cựa trong khi dùng Cloformamide hay bất cứ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Nếu bệnh nhân có sốt (giải địa độ 38°C hoặc cao hơn), đau bụng dưới, đau lưng, dịch tiết âm đạo có màu hồng, buồn nôn, xuất huyết âm đạo, v.v./ hoặc liên quan đến đau nửa đầu, bệnh nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Để tránh sự lạm dụng của trẻ em, tránh tiếp xúc với mắt. Không nuốt.

Phụ nữ có thai và đang cho con bú: Phụ nữ có thai, đặc biệt là vào 3 tháng đầu tiên của thai kỳ cần phải cẩn trọng khi dùng Cloformamide trong 3 tháng đầu của thai kỳ liên quan đến độc tính sinh dục và không cho thấy tác hại trực tiếp hoặc gián tiếp lên quần đàn đực thí nghiệm.

Lưu ý: Đất ẩm không cần sử dụng cùng với đất thuốc.

Cloformamide và chất chuyển hóa bài tiết ra sữa. Nên ngừng cho con bú trong thời gian điều trị với Cloformamide.

Dose & hướng dẫn sử dụng: Dùng theo hướng dẫn.

Nhà sản xuất: BAYER PHARMA AG 51368 Leverkusen – Germany

Số giấy xác nhận Quãng cáo của Cục Quản Lý Dược... ngày... tháng... năm... Ngày, tháng, năm in tài liệu...

T_{ij}^2 lie so viel mehr nahe