

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 175 /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày...13 tháng 06... năm 2017.

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH United International Pharma

Địa chỉ: 16 VSIP II, đường số 7, KCN Việt Nam-Singapore II, KLDVĐT Bình Dương, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 08 39621000

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Maxedo	VD-24656-16

Phương tiện quảng cáo: Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 1 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty TNHH United International Pharma có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

THUỐC HẠ SỐT + GIẢM ĐAU VỊ CAM

Maxedo®

Acetaminophen - Hỗn dịch uống

250 mg

150 mg



HIỆU QUẢ TRONG HẠ SỐT
& GIẢM ĐAU CHO TRẺ



Hương vị CAM dễ uống với kỹ thuật bào chế
Taste Rite™

VỊ CAM dễ uống

THÔNG TIN SẢN PHẨM: Maxedo®

gói hỗn dịch uống 150 mg, 250 mg. **THÀNH PHẦN:** Mỗi gói (5 mL) hỗn

dịch Maxedo® chứa: Acetaminophen (paracetamol) 150 mg hoặc 250 mg. **CHỈ ĐỊNH:** Thuốc được chỉ

định để hạ sốt cũng như giảm đau nhức do cảm, cúm, viêm amidan, nhiễm trùng hô hấp, đau răng,

đau do mọc răng và các phản ứng sau chùng ngứa. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG:** Dùng đường

uống, mỗi 4 - 6 giờ khi cần thiết. Gói hỗn dịch Maxedo® 150 mg/ 5 mL: Trẻ 2 - 3 tuổi: 5 mL (1 gói);

Trẻ 4 - 6 tuổi: 5 mL - 7,5 mL (1 đến 1½ gói). Gói hỗn dịch Maxedo® 250 mg/ 5 mL: Trẻ 1 - 2 tuổi:

2,5 mL (½ gói); Trẻ 2 - 6 tuổi: 2,5 mL - 5 mL (½ đến 1 gói); Trẻ 6 - 12 tuổi: 5 mL - 7,5 mL (1 đến

1½ gói). Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Thuốc này chống chỉ định với những

bệnh nhân bị suy gan nặng hoặc nhạy cảm với acetaminophen. Không nên sử dụng thuốc trong thời gian dài

cho những bệnh nhân bị thiếu máu, bệnh tim, thận và gan. **THẬN TRỌNG:** Nên dùng thận trọng acetaminophen cho những bệnh nhân bị suy chức năng thận.

Không dùng quá liều chỉ định. Không nên dùng thuốc với liều tối đa trong hơn 10 ngày trừ khi có lời khuyên và theo dõi của bác sĩ. Không nên dùng thuốc khi

đau hơn 10 ngày, hoặc sốt hơn 3 ngày trừ khi được bác sĩ hướng dẫn. Nếu đau hay sốt kéo dài hoặc xấu hơn, có các triệu chứng mới hoặc có sung, đỏ nên đến

bác sĩ để khám vì các triệu chứng này có thể là dấu hiệu của tình trạng nghiêm trọng. Acetaminophen (paracetamol) có liên quan với nguy cơ gây phản ứng da

ng nghiêm trọng hiếm gặp. Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Stevens-Johnson (SJS), hội chứng

hoại tử da nhiễm độc (TEN) hay hội chứng Lyell, và hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính (AGEP). Khi phát hiện những dấu hiệu phát ban trên da

đầu tiên hoặc bất kỳ dấu hiệu phản ứng quá mẫn nào khác, bệnh nhân cần phải ngừng sử dụng thuốc. Người đã từng bị các phản ứng trên da nghiêm trọng

do acetaminophen thì không nên sử dụng acetaminophen hoặc các thuốc khác có chứa acetaminophen (paracetamol). **LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:**

acetaminophen không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc. **PHỤ NỮ MANG THAI VÀ CHO CON BÚ:** Có thể sử dụng ở phụ nữ mang thai khi

thật cần. Nghiên cứu ở phụ nữ cho con bú dùng acetaminophen không thấy tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ. Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng. **TÁC**

DỤNG PHỤ: Hiếm có tác dụng phụ khi sử dụng acetaminophen với liều dùng và thời gian dùng được đề nghị. Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh

thoảng xảy ra. Ít gặp: + Da: ban. + Dạ dày - ruột: buồn nôn, nôn. + Huyết học: loạn tạo máu (giảm bạch cầu trung tính, giảm toàn thể huyết cầu, giảm bạch

cầu), thiếu máu. + Thận: bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày. Xin thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng

thuốc. **SẢN XUẤT TẠI:** Công ty TNHH United International Pharma, Địa chỉ: số 16 VSIP II, đường số 7, KCN Việt Nam- Singapore II, P. Hòa Phú, TP.TDM, Bình

Dương. SĐK: VD-24656-16 (Maxedo 150 mg)/ VD-23420-15 (Maxedo 250 mg). **ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.**



Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Cục Quản Lý Dược: ... Ngày...tháng...năm. Ngày in tài liệu: ...



13/6/197 Arz