

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 178/2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Đại Bắc

Địa chỉ: Số 11 đường Công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: 043. 7761445

Fax: 043. 7761448

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Yumangel F	VN-19209-15

Phương tiện quảng cáo: Trên tờ rơi cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty TNHH Đại Bắc có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**




Nguyễn Tất Đạt



Yumangel F

Thuốc dạ dày chữ “Y”

**Giảm nhanh
cơn đau dạ dày**



Trang 1

Nhà sản xuất: YUHAN CORPORATION
219, Yeongudanji-ro, Ochang-eup,
Cheongwon-gun, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

Nhà phân phối:
CÔNG TY TNHH ĐẠI BẮC
số 11 đường công nghiệp 4, KCN Sài Đồng B,
phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Số giấy Xác nhận nội dung quảng cáo của Cục QLD - Bộ Y tế: xxxx/xx/QLD-TT, ngày xx tháng xx năm 2017.
Tài liệu gồm 2 trang. Thông tin chi tiết xem ở trang 2.

Yumangel F

[THÀNH PHẦN] Mỗi gói 15ml chứa

Hoạt chất: Almagat 1.50g

[DẠNG BẢO CHẾ] Hỗn dịch uống

[QUY CÁCH ĐÓNG GÓI] 15ml x 20 gói /hộp

[CHỈ ĐỊNH]

Thuốc có tác dụng kháng acid và cải thiện các chứng bệnh sau: loét dạ dày, loét tá tràng; viêm dạ dày; các chứng bệnh do tăng tiết acid (ợ nóng, buồn nôn, nôn, đau dạ dày, chứng ợ); bệnh trào ngược thực quản

[LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG]

- Người lớn: Uống 1 gói hỗn dịch /lần x 3 lần/ngày, sau khi ăn 1-2 giờ và trước khi đi ngủ.
Nếu các triệu chứng gây ra do loét dạ dày và tá tràng mức độ nặng hơn, uống 1 gói x 4 lần/ngày.
- Trẻ em (6-12 tuổi): Dùng nửa liều dành cho người lớn
- Liều lượng cần được điều chỉnh phù hợp với độ tuổi và triệu chứng bệnh của bệnh nhân

[CHỐNG CHỈ ĐỊNH]

Không dùng thuốc cho bệnh nhân mắc cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

[THẬN TRỌNG]

1. Thận trọng khi dùng thuốc cho những bệnh nhân đang sử dụng các thuốc khác.
2. Lưu ý khi sử dụng:
 - Dùng đúng liều và đúng cách.
 - Trẻ em khi sử dụng cần có sự giám sát của người lớn.
 - Nếu sau 2 tuần các triệu chứng bệnh không được cải thiện, ngưng dùng thuốc và hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

[TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN]

Trên bộ máy tiêu hoá: táo bón hoặc tiêu chảy có thể xảy ra trong khi dùng thuốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ khi gặp phải các tác dụng không mong muốn của thuốc.

[TƯƠNG TÁC THUỐC]

- Thuốc có thể cản trở sự hấp thu tetracycline, vì vậy không nên dùng kết hợp với tetracycline
- Cần trọng trong cách dùng vì sự hấp thu thuốc hay sự tăng pH đường tiêu hoá và dịch cơ thể có thể ảnh hưởng đến sự hấp thu hay bài xuất của các thuốc dùng kèm.

[SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ]

Độ an toàn cho phụ nữ mang thai và cho con bú chưa được thiết lập.

[ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC]

Không gây ảnh hưởng.

[ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC]

YUMANGEL F có tác dụng trung hoà acid dạ dày nhanh chóng và kéo dài, duy trì pH dạ dày ở mức bình thường (pH=3-5) trong một giai đoạn dài do nó có cấu trúc mạng tinh thể vững chắc.

YUMANGEL F dạng hỗn dịch tạo ra một lớp màng nhầy tương tự lớp chất nhầy trên bề mặt niêm mạc dạ dày, bởi vậy nó có tác dụng bảo vệ tính toàn vẹn của lớp chất nhầy, giảm sự tổn thương trực tiếp vào các tế bào biểu mô.

YUMANGEL F hấp thụ và làm mất hoạt tính của acid mật, khi chất này trào ngược vào dạ dày và có thể làm cho các rối loạn về dạ dày ruột trở nên trầm trọng hơn. Đồng thời nó cũng làm giảm hoạt động của pepsin.

YUMANGEL F có tác dụng loại bỏ gốc tự do, yếu tố gây phá huỷ lớp chất nhầy niêm mạc dạ dày.

[DƯỢC ĐỘNG HỌC]

Thuốc được hấp thu tốt qua đường uống. Những nghiên cứu thử nghiệm trên chuột cho thấy sử dụng almagat với liều 4g/kg trong 30 ngày không làm tăng nồng độ Mg^{2+} và Al^{3+} trong huyết thanh quá mức cho phép. Vì vậy thuốc không gây kiểm huyết.


[QUÁ LIỀU]

Nó có thể gây ra giảm phosphat huyết và loãng xương khi điều trị kéo dài tại liều cao hoặc ở những bệnh nhân trên một chế độ ăn uống phospho thấp.

[BẢO QUẢN] Bảo quản dưới 30°C, trong bao bì kín và tránh ánh sáng.

[HẠN DÙNG] 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ, dược sĩ


14/6/2017