

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 195 /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: **VPDD Abbott Laboratories SA**

Địa chỉ: **Tầng 7, 8 - tháp A, tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã , Ba Đình, Hà Nội**

Điện thoại: **04 3733 7486**

Fax: (Số fax)

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Fatig	VN-10352-10

Phương tiện quảng cáo: Trên sách báo, tạp chí, tờ rơi cho công chúng

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 02 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

VPDD Abbott Laboratories SA có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt



FATIG[®]



Handwritten signature
28/6/2018

Điều trị suy nhược chức năng



magnesium

calcium

phosphore



Số giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc của Cục Quản lý Dược - Bộ Y Tế:/XNQC-QLD,
Ngày xx tháng xx năm xxxx; Ngày tháng năm in tài liệu: xx/xx/xxxx;
Tài liệu gồm có 2 trang. Thông tin chi tiết sản phẩm xin xem trang 2

Handwritten signature
28/6/2018

1



FATIG®

magnesium

calcium

phosphore



Thông tin kê toa

TÊN THUỐC: FATIG®, dung dịch uống. **MÔ TẢ SẢN PHẨM:** Dung dịch uống, ống 10 ml; Hộp 2 x 10 ống; Hộp 10 ống. **THÀNH PHẦN VÀ HẠM LƯỢNG:** Magnesi gluconat: 0,426g; Calci glycerophosphat: 0,456g; Tá dược: Dung dịch sorbitol (70%) (không tinh thể hóa), sucrose, natri benzoat (E211), natri metyl parahydroxybenzoat (E219), vị trái lý đen, dung dịch acid clohydric loãng, nước tinh khiết. Cho một ống 10ml. **Một ống có chứa:** Phospho nguyên tố: 67mg; (2,17mmol), Calci nguyên tố: 87,3mg (2,17 mmol); Magnesi nguyên tố: 25mg (1,03 mmol). **CHỈ ĐỊNH:** Thuốc này được dùng để điều trị suy nhược chức năng. **LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:** Chỉ dùng cho người lớn và trẻ trên 6 tuổi. Không dùng thuốc này quá 4 tuần. Không được tiêm thuốc này. **LIỀU DÙNG:** Người lớn: 2 đến 3 ống mỗi ngày. Trẻ em từ 6 đến 15 tuổi: 1 ống mỗi ngày. **CÁCH DÙNG:** Pha loãng ống thuốc trong một ít nước và uống trước bữa ăn. **ĐƯỜNG DÙNG:** Đường uống. **LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ:** Không dùng thuốc này kéo dài quá 4 tuần. **CHỐNG CHỈ ĐỊNH:** Không dùng thuốc này trong những trường hợp sau: Dị ứng với một trong những thành phần của dung dịch, đặc biệt là với parabens. Nồng độ calci tăng bất thường trong máu hoặc trong nước tiểu. Có cặn calci trong mô. Đang theo chế độ ăn kiêng đường fructose (vì thuốc này có chứa sorbitol và sucrose). Trẻ dưới 6 tuổi. Nói chung thuốc này không được uống kết hợp cùng với KAYEXALATE, trừ khi có chỉ định của thầy thuốc. **THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:** Vì thuốc này có chứa sorbitol, đề nghị báo cáo cho bác sĩ của bạn biết nếu bạn bị tắc ống mật hoặc bị suy gan nặng. Nếu bạn bị tiểu đường hoặc đang theo chế độ ăn ít tinh bột, cần lưu ý rằng mỗi ống chứa 2.65g sucrose, 87,3mg calci và 67mg phospho. **PHỤ NỮ MANG THAI - THỜI KỲ CHO CON BÚ:** Tốt nhất không nên dùng thuốc này trong thời kỳ mang thai. Tránh dùng thuốc này trong thời kỳ cho con bú. **TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:** Đối với một số người thuốc này có thể có tác dụng không mong muốn gây khó chịu ở mức độ nặng hay nhẹ: Vì thuốc có chứa Sorbitol, nên có thể có rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy. **Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.** **Để thuốc xa tầm tay trẻ em.** **NHÀ SẢN XUẤT:** PHARMATIS. Zone d' Activité Est 1, 60190 ESTREES SAINT DENIS- France(Pháp)". **CÔNG TY NHẬP KHẨU:** VIMEDIMEX BÌNH DƯƠNG, 18L1-2 VSIP II, ĐƯỜNG SỐ 3, VSIP 2. 72000 HÒA PHÚ, THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG, VIỆT NAM.

Tài liệu tham khảo: (1) Thông tin kê toa

Để biết thêm thông tin về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ:

VPĐD Abbott HCM : 02 Ngõ Đức Kế. Quận 1- ĐT: (08) 38242006

VPĐD Abbott Hà Nội: 521 Kim Mã. Quận Ba Đình- ĐT: (04) 37337486

Handwritten signature and date:
28/6/2018