

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *199* /2017/XNQC-QLD

Hà Nội, ngày...*03* tháng..*02* năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO THUỐC

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Long

Địa chỉ: **Lô 2A, Khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội**

Điện thoại: **04 3763 4538**

STT	Tên thuốc	Số đăng ký thuốc
1	Berzencin	VD-21288-14

Phương tiện quảng cáo: Trên sách, báo, tạp chí, tờ rơi, báo điện tử, trang thông tin điện tử, màn hình chuyên quảng cáo, pano, poster, bảng, biển, phương tiện giao thông cho công chúng.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung gồm 01 trang có đóng dấu xác nhận của Cục Quản lý Dược đính kèm Giấy xác nhận này.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kim Long có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Tất Đạt

Viên nang

Berzencin

Berberin clorid100mg



ĐIỀU TRỊ: + TIÊU CHẢY, VIÊM RUỘT
+ LỖY TRỰC KHUẨN, HỘI CHỨNG LỖY
+ LỖY AMÍP

30/6/17
Jeb

BERZENCIN
TRỊ TIÊU CHẢY



Dạng thuốc: Viên nang cứng. **Quy cách đóng gói:** Hộp 03 vỉ x 10 viên nang cứng, hộp 06 vỉ x 10 viên nang cứng. **Công thức bào chế cho 1 đơn vị (1 viên) thành phẩm:** Mỗi viên nang cứng chứa: Berberin clorid-100mg, Tá dược vừa đủ-1 viên nang cứng (Tá dược gồm: Tinh bột sắn, lactose, gelatin, microcrystalline cellulose, natri lauryl sulfat, amidon, tartrazin). **Chỉ định:** Điều trị các trường hợp: Lỵ trực khuẩn, hội chứng lỵ, lỵ amíp, viêm ruột, tiêu chảy. **Cách dùng và liều dùng:** Nên uống 1 lần vào buổi sáng trước bữa ăn, và một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Người lớn và trẻ em trên 15 tuổi: uống 1-2 viên/ lần, ngày 2 lần. Trẻ em từ 5-15 tuổi: uống 1 viên/ lần, ngày 2 lần. Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc. **Chống chỉ định:** Quá mẫn với các thành phần của thuốc. Phụ nữ có thai. **Thận trọng:** Thận trọng với những người bị rối loạn tiêu hóa, trướng bụng, đầy hơi. **Tác dụng không mong muốn:** Thuốc có thể gây táo bón khi dùng liều cao, kéo dài. Tác dụng này sẽ hết khi ngừng thuốc. **Tác động của thuốc khi lái xe hoặc vận hành máy móc:** Thuốc không gây buồn ngủ, do đó sử dụng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc. **Tương tác thuốc:** Chưa có tài liệu báo cáo. **Quá liều và xử trí:** Sử dụng quá liều sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu chất dinh dưỡng, làm cho tiêu hóa kém đi. Cần điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Xử trí: Ngừng dùng thuốc và tham vấn ý kiến của thầy thuốc. **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Lưu ý: Không được dùng thuốc đã quá hạn dùng. Khi thuốc có biểu hiện biến màu, viên thuốc ẩm, mốc, mờ nhãn... hoặc có biểu hiện nghi ngờ khác phải hỏi lại nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn. **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C. **Tiêu chuẩn áp dụng:** TCCS. **Tránh xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.**

Sô giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Ngày.....tháng.....năm 2017. Nộp bản in ngày.....tháng.....năm 2017
Cơ sở đăng ký: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Tây / Địa chỉ: 10A Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội



Vì cuộc sống khỏe mạnh hơn!

Tiếp thị & PP: **Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kim Long**
Lô2A, Khu Liên Cơ, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0979 29 19 20

Sản xuất tại: **Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Hà Tây**
La Khê, Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 04. 3382 4685